

# CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS (MAIORES DE 7 ANOS) E ADOLESCENTES<sup>1</sup>

ATUALIZADO  
14.03.2018

INTERVALO ENTRE AS DOSES	VACINAS	ESQUEMA
PRIMEIRA VISITA	BCG <sup>2</sup>	DOSE ÚNICA
	HEPATITE B	PRIMEIRA DOSE
	dT - DUPLA TIPO ADULTO <sup>3</sup>	PRIMEIRA DOSE
	VIP	PRIMEIRA DOSE
	HPV <sup>4</sup>	PRIMEIRA DOSE
	SARAMPO, CAXUMBA, RUBÉOLA - SCR	PRIMEIRA DOSE
	MENINGOCÓCICA C <sup>5</sup>	SEGUNDA DOSE
2 MESES APÓS A PRIMEIRA VISITA	HEPATITE B <sup>6</sup>	SEGUNDA DOSE
	dT - DUPLA TIPO ADULTO <sup>3</sup>	SEGUNDA DOSE
	VIP	SEGUNDA DOSE
4-6 MESES APÓS PRIMEIRA VISITA	SARAMPO, CAXUMBA, RUBÉOLA - SCR	SEGUNDA DOSE
	HPV <sup>7</sup>	TERCEIRA DOSE
	HEPATITE B <sup>8</sup>	TERCEIRA DOSE
	dT - DUPLA TIPO ADULTO <sup>3</sup>	TERCEIRA DOSE
	VIP	TERCEIRA DOSE
DE ACORDO COM A SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA	FEBRE AMARELA <sup>9</sup>	DOSE ÚNICA

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde/CVE/Divisão de Imunização

1. Adolescência - período entre 10 e 19 anos de idade. Caso a pessoa apresente documentação com esquema de vacinação incompleto, completar o esquema iniciado.
2. A vacina BCG é indicada para pessoas até 15 anos de idade.
3. Caso o adolescente tenha recebido três ou mais doses das vacinas DTP, DT e dT, aplicar uma dose de reforço, se decorridos 10 anos da última dose.
4. Vacina papilomavirus humano para meninas de 9 anos até 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade. E meninos de 11 anos a 14 anos, 11 meses e 29 dias.
5. Vacina Meningocócica C de 11 anos até 14 anos, 11 meses e 29 dias.
6. O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose da vacina hepatite B é de 4 semanas.
7. O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose da vacina papilomavirus humano é de 6 meses.
8. O intervalo para a terceira dose da vacina hepatite B pode ser de dois meses após a segunda, desde que o intervalo de tempo decorrido da primeira dose seja, no mínimo, de quatro meses.
9. Para aqueles que residem ou viajam para regiões onde houver indicação, de acordo com a situação epidemiológica.

Na profilaxia do tétano após alguns tipo de ferimentos, deve-se reduzir este intervalo para 5 anos.