

INQUÉRITO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - 2003

ISA Capital

Doenças Crônicas e Deficiências Físicas


Tabela 1 - Prevalência (%) das Doenças Crônicas referidas por maiores de 20 anos, segundo o grupo etário e o sexo. ISA - Capital, 2003.

Doenças Crônicas	20 a 59 anos		60 anos e mais		Média %	p
	M	F	M	F		
Enxaqueca/dor de cabeça	120,4	329,9	83,9	166,7	219,3	0.0000
Alergia	175,9	235,9	135,0	250,3	207,9	0.0129
Depressão/ansiedade/probl. emocionais	109,4	279,6	146,0	296,5	206,9	0.0000
Doença da coluna/costas	132,7	194,0	220,3	355,6	186,0	0.0000
Hipertensão	89,7	136,2	390,8	516,3	166,9	0.0000
Doença digestiva crônica (úlcera/gastrite)	92,1	113,6	83,8	147,5	106,4	0.2507
Artrite/reumatismo/artrose	19,6	43,8	155,2	275,4	61,1	0.0000
Doença crônica do pulmão (asma/bronquite/enfisema)	31,3	57,2	82,2	64,5	49,3	0.0373
Diabetes	23,3	26,4	160,5	189,6	47,4	0.0000
Doença de pele	22,6	56,9	62,8	78,9	45,8	0.0023
Osteoporose	2,3	31,2	26,8	254,9	39,3	0.0000
Anemia	10,1	56,3	57,5	51,1	37,7	0.0003
Doença do coração	5,7	33,4	127,1	101,3	34,0	0.0000
Doença renal crônica	24,0	29,1	39,7	37,8	28,5	0.6153
Acidente Vascular Cerebral (derrame cerebral)	12,0	10,6	72,4	41,0	17,5	0.0007
Câncer (tumor maligno)	-	6,9	42,4	22,5	7,7	0.0002
Epilepsia	3,3	12,2	7,4	4,2	7,7	0.2541
Cirrose	4,2	-	25,9	4,7	3,6	0.0175
Doença de Chagas	-	-	6,8	5,9	0,9	0.0371
Esquistossomose (barriga d'água)	-	-	1,9	-	0,0	0.3481
Hanseníase	-	-	1,5	-	0,0	0.4221
Tuberculose	-	-	1,4	-	0,0	0.4590

Tabela 2- Prevalência (%) das principais doenças crônicas referidas por maiores de 20 anos, segundo a escolaridade do chefe de família. ISA Capital, 2003.

Doença Crônica	Sexo	Escolaridade (anos)			
		0 ou < 4	4 a 7	8 a 11	12 e +
Enxaqueca/dor de cabeça	M	196,8	138,5	70,4	78,1
	F	326,6	336,3	305,3	176,0
Alergia	M	162,5	159,0	189,5	172,3
	F	219,6	255,5	261,1	179,7
Depressão/ansiedade/problems emocionais	M	135,0	133,4	102,1	79,8
	F	218,3	318,8	310,9	224,1
Doença da coluna/costas	M	203,3	174,9	109,9	91,6
	F	252,3	211,5	217,9	195,0
Hipertensão	M	176,6	157,7	87,0	98,2
	F	275,4	190,9	165,9	144,3
Doença digestiva crônica (úlcera/gastrite)	M	69,8	90,5	106,5	87,8
	F	104,2	96,6	143,6	121,0
Artrite/reumatismo/artrose	M	68,8	30,4	29,5	35,2
	F	80,6	80,3	92,3	54,0
Doença do pulmão (asma/brônquite/enfisema)	M	36,6	45,1	31,2	35,3
	F	39,4	72,0	73,5	21,0
Diabetes	M	45,4	55,6	22,4	43,4
	F	88,4	44,4	45,1	34,6
Osteoporose	M	9,3	5,0	0,6	12,2
	F	73,1	66,0	57,5	84,8
Doença do coração	M	30,2	27,0	15,1	12,8
	F	59,6	40,5	39,7	30,2

Figura 1 - Condutas referidas pelos hipertensos e diabéticos para controle da doença. ISA Capital, 2003.



**Figura 2 - Seguimento médico periódico dos hipertensos e diabéticos, segundo o sexo.
ISA Capital, 2003.**




Figura 3 - Motivos de não seguimento médico periódico dos hipertensos e diabéticos. ISA Capital, 2003.




Tabela 3- Porcentagem de deficiência física segundo o tipo. ISA Capital, 2003.

Tipo de deficiência	Porcentagem
Deficiência auditiva	3,94
Dificuldade de ouvir	3,10
Surdez de um ouvido	0,48
Surdez dos dois ouvidos	0,36
Deficiência visual	6,76
Dificuldade de enxergar	6,06
Cegueira de um olho	0,40
Cegueira dos dois olhos	0,30
Deficiência motora	0,91
Perda de membro	0,72
Paralisia de membro	0,19

**Figura 4 - Distribuição percentual das deficiências físicas, segundo sexo e a faixa etária.
ISA Capital, 2003.**




Figura 5 - Distribuição percentual de deficiências físicas, segundo a escolaridade do chefe da família. ISA Capital, 2003.

