



I=I



INDETECTÁVEL

=

INTRANSMISSÍVEL



PESSOAS QUE VIVEM COM HIV E ESTÃO EM TRATAMENTO SE TORNAM INDETECTÁVEIS, QUANDO HÁ BAIXA QUANTIDADE DE VÍRUS NO CORPO. E SE ISSO SE MANTIVER POR PELO MENOS SEIS MESES, O TORNA INTRANSMISSÍVEL, OU SEJA, A PESSOA NÃO TRANSMITE O VÍRUS.



SAIBA MAIS:

PREFEITURA.SP.GOV.BR/DSTAIDS/IIGUALI

@programadstaids
prefeitura.sp.gov.br/saude/dstaids



Ministério da Saúde
Representação no Brasil



DST/AIDS
DEPARTAMENTO NACIONAL



CIDADE DE SÃO PAULO
SAÚDE

Pessoas que vivem com HIV fazem tratamento com medicamentos chamados de antirretrovirais. Além dos benefícios para a qualidade de vida, a terapia antirretroviral (TARV) também é usada com a finalidade de prevenção da transmissão do HIV para outras pessoas. **SIM, O TRATAMENTO TAMBÉM É UMA FORMA DE PREVENÇÃO!**

Se liga como: seguindo o tratamento de forma regular, a quantidade de vírus circulante no corpo da pessoa que vive com HIV diminui, mas não some. E quando a quantidade de vírus (também chamada de carga viral) nos exames de sangue é muito pequena, é considerada indetectável. Os estudos científicos mostram que as pessoas que mantêm a carga viral indetectável por pelo menos seis meses não transmitem mais o vírus para outras pessoas em relações sexuais. Mas só vale se continuar o tratamento com a TARV e se a carga viral permanecer indetectável.

E TODO MUNDO QUE TEM HIV CHEGA À CARGA VIRAL INDETECTÁVEL?

Sim, se tiverem acesso à medicação adequada. No Brasil, o acesso ao tratamento é gratuito!

A TARV É IGUAL PARA TODO MUNDO QUE VIVE COM HIV?

Não. Existem uma série de combinações diferentes. Para cada pessoa é avaliada o melhor conjunto de medicamentos.

FIQUE ATENTO! A camisinha continua sendo a mais abrangente forma de prevenção, já que também previne outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e da gravidez indesejada.