

**Parque Santo Dias. Flora: última atualização do Herbário Municipal em
30/11/2018**

| GRUPO / FAMÍLIA / Espécie | nome popular | fonte de dados | habito | status de conservação | origem | guia |
|--|-----------------------------------|----------------|--------|-----------------------|--------|------|
| ANGIOSPERMAS | | | | | | |
| ACANTHACEAE | | | | | | |
| <i>Eranthemum pulchellum</i> Andrews | camarão-azul | V | ee | | c | |
| <i>Mendoncia velloziana</i> Mart. | cipó-d'água | H | tr | | n | |
| <i>Pachystachys lutea</i> Nees | camarão-amarelo | V | arb | | c | |
| ADOXACEAE | | | | | | |
| <i>Sambucus australis</i> Cham. & Schltl. | sabugueiro | GP | avt | | n | |
| AMARANTHACEAE | | | | | | |
| <i>Hebanthe eriantha</i> (Poir.) Pedersen | fáfia | H | suba | | n | |
| ANACARDIACEAE | | | | | | |
| <i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi | aroeira-mansa | GP, H | árv | | n | X |
| <i>Tapirira guianensis</i> Aubl. | tapirira, fruta-de-pomba | AD, GP, H | árv | | n | |
| ANNONACEAE | | | | | | |
| <i>Guatteria australis</i> A.St.-Hil. | pindaíba | AD, GP, H | árv | | n | |
| APOCYNACEAE | | | | | | |
| <i>Gonolobus parviflorus</i> Decne. | | H | tr | | n | |
| <i>Peltastes peltatus</i> (Vell.) Woodson | cipó-bênção | H | tr | | s | |
| <i>Prestonia coalita</i> (Vell.) Woodson | | H | tr | | n | |
| <i>Tabernaemontana catharinensis</i> A.DC. | leiteira-dois-irmãos, mata-pasto | GP, H | avt | | n | |
| AQUIFOLIACEAE | | | | | | |
| <i>Ilex dumosa</i> Reissek | cauninha, erva-mate | GP, H | árv | | n | |
| <i>Ilex paraguariensis</i> A.St.-Hil. | erva-mate, congonha | AD | árv | | n | |
| ARACEAE | | | | | | |
| <i>Heteropsis salicifolia</i> Kunth | | H | he | | n | |
| <i>Monstera deliciosa</i> Liebm. | costela-de-adão, banana-de-macaco | V | he | | c | |
| <i>Philodendron appendiculatum</i> Nadruz & Mayo | | H | he | | n | |
| <i>Xanthosoma</i> sp. | taioba | V | eriz | | c | |

| | | | | | | |
|---|--|--------|--------------|---------------|---|---|
| ARALIACEAE | | | | | | |
| <i>Schefflera angustissima</i> (Marchal) Frodin | mandioqueira | GP, H | árv | | n | |
| <i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K.Koch | árvore-do-papel-de-arroz | H | avt | | c | |
| ARECACEAE | | | | | | |
| <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude | seafórtia | AD, H | pu | | s | |
| <i>Bactris setosa</i> Mart. | tucum | GP, H | pc | | n | |
| <i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. | areca-bambu | V | pc | | c | |
| <i>Euterpe edulis</i> Mart. | palmito-jussara | AD | pu | VUBR, VUSP | n | x |
| <i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart. | palmeira-de-leque-da-china | V | pu | | c | |
| <i>Syagrus hoehnei</i> Burret | palmeira-prateada, icá | GP, H | pu | | n | x |
| <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman | jerivá | AD, GP | pu | | n | x |
| ASPARAGACEAE | | | | | | |
| <i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Jessop | aspargo-samambaia | H | tr | | c | |
| <i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev. | coqueiro-de-vênus, cordiline-vermelha | V | dr | | c | |
| <i>Dracaena marginata</i> Hort. | dracena | V | dr | | c | |
| ASTERACEAE | | | | | | |
| <i>Achyrocline alata</i> (Kunth) DC. | macela | H | ee | | n | |
| <i>Baccharis dracunculifolia</i> DC. | vassourinha | H | arb, avt | | n | |
| <i>Baccharis semiserrata</i> DC. | | GP, H | arb, avt | | n | |
| <i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H.Rob. | enxuga, erva-preá | H | ae | | n | |
| <i>Heterocondylus alatus</i> (Vell.) R.M.King & H.Rob. | | GP, H | arb | | n | |
| <i>Hypochoeris</i> sp. | | H | ee | | n | |
| <i>Mikania capricorni</i> B.L.Rob. | | H | tr | | n | |
| <i>Mikania micrantha</i> Kunth | | H | tr | | n | |
| <i>Mikania triangularis</i> Baker | | H | tr | | n | |
| <i>Piptocarpha axillaris</i> (Less.) Baker | cambará-do-campo | GP | avt | | n | |
| <i>Piptocarpha oblonga</i> (Gardner) Baker | cipó-cambraia | GP, H | avt, árv, tr | | n | |
| <i>Vernonanthura divaricata</i> (Spreng.) H.Rob. | | GP, H | árv | | n | |
| <i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt. | assa-peixe | GP, H | avt | | n | |
| <i>Vernonanthura</i> sp. | assa-peixe | H | arb | | n | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------|-----|--|---|---|
| BIGNONIACEAE | | | | | | |
| <i>Adenocalymma bracteatum</i> (Cham.) DC. | | H | tr | | n | |
| <i>Amphilophium crucigerum</i> (L.) L.G.Lohmann | pente-de-macaco | H | tr | | n | |
| <i>Anemopaegma prostratum</i> DC. | petequeira | H | tr | | n | |
| <i>Dolichandra unguis-cati</i> (L.) L.G.Lohmann | unha-de-gato | H | tr | | n | |
| <i>Fridericia conjugata</i> (Vell.) L.G.Lohmann | | H | tr | | n | |
| <i>Fridericia samyoides</i> (Cham.) L.G.Lohmann | | H | tr | | n | |
| <i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos | ipê-amarelo | GP, H | avt | | n | |
| <i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos | ipê-roxo, ipê-rosa | V | árv | | n | |
| <i>Jacaranda puberula</i> Cham. | carobinha | AD, GP, H | árv | | n | |
| <i>Mansoa diffcilis</i> (Cham.) Bureau & K.Schum. | cipó-de-sino | H | tr | | n | |
| <i>Pyrostegia venusta</i> (Ker Gawl.) Miers | cipó-de-são-joão | H | tr | | n | |
| <i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv. | espatódea | H | árv | | c | |
| <i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC. | ipê-de-el-salvador | V | árv | | c | |
| <i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith | ipê-branco | V | avt | | c | X |
| <i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth | ipê-de-jardim | H | avt | | s | |
| BORAGINACEAE | | | | | | |
| <i>Cordia sellowiana</i> Cham. | capitão-do-mato | GP, H | árv | | n | |
| BRASSICACEAE | | | | | | |
| <i>Raphanus sativus</i> L. | nabo | H | ee | | c | |
| BROMELIACEAE | | | | | | |
| <i>Vriesea incurvata</i> Gaudich. | bromélia | H | ep | | n | |
| CACTACEAE | | | | | | |
| <i>Hatiora salicornioides</i> (Haw.) Britton & Rose | | V | ep | | n | |
| <i>Rhipsalis teres</i> (Vell.) Steud. | ripsális | H | ep | | n | |
| CANNABACEAE | | | | | | |
| <i>Trema micrantha</i> (L.) Blume | crindiúva | GP, H | avt | | n | |
| CARDIOPTERIDACEAE | | | | | | |
| <i>Citronella paniculata</i> (Mart.) R.A.Howard | falsa-congonheira | AD, GP, H | árv | | n | |
| CELASTRACEAE | | | | | | |
| <i>Hippocratea volubilis</i> L. | cipó-de-borracha, cipó-preto | H | tr | | n | |
| <i>Maytenus evonymoides</i> Reissek | cafezinho | GP, H | árv | | n | |
| <i>Maytenus gonoclada</i> Mart. | | AD | árv | | n | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------|------|--|---|---|
| CHRYSOBALANACEAE | | | | | | |
| <i>Hirtella hebeclada</i> Moric. ex DC. | cinzeiro, pau-de-lixa | AD, GP, H | árv | | n | |
| CLUSIACEAE | | | | | | |
| <i>Tovomitopsis paniculata</i> (Spreng.) Planch. & Triana | azedinho | AD | árv | | n | |
| COMMELINACEAE | | | | | | |
| <i>Dichorisandra hexandra</i> (Aubl.) C.B.Clarke | | H | ee | | n | |
| <i>Dichorisandra paranaensis</i> D.Maia, Cervi & Tardivo | | H | ee | | n | |
| <i>Tradescantia zebrina</i> Heynh. ex Bosse | lambari, trapoeraba-roxa | V | era | | s | |
| <i>Tripogandra diuretica</i> (Mart.) Handlos | | H | era | | n | |
| CONVOLVULACEAE | | | | | | |
| <i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth | campaína, corda-de-viola | H | tr | | n | |
| <i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth | campaína | H | tr | | n | |
| <i>Ipomoea triloba</i> L. | | H | tr | | s | |
| <i>Merremia macrocalyx</i> (Ruiz & Pav.) O'Donell | campaína, corda-de-viola | H | tr | | n | |
| CUCURBITACEAE | | | | | | |
| <i>Cayaponia cabocla</i> (Vell.) Mart. | | H | tr | | n | |
| <i>Cayaponia martiana</i> (Cogn.) Cogn. | | H | tr | | n | |
| <i>Wilbrandia longisepala</i> Cogn. | | H | tr | | n | |
| CUNONIACEAE | | | | | | |
| <i>Lamanonia ternata</i> Vell. | guaperê | GP, H | árv | | n | |
| CYPERACEAE | | | | | | |
| <i>Pleurostachys foliosa</i> Kunth | | H | eces | | n | |
| <i>Scleria panicoides</i> Kunth | | H | eriz | | n | |
| ELAEOCARPACEAE | | | | | | |
| <i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth. | laranjeira-do-mato, ouriceiro | AD, GP, H | árv | | n | |
| <i>Sloanea hirsuta</i> (Schott) Planch. ex Benth. | sapopemba, carrapicheiro | AD, GP, H | avt | | n | x |
| ERICACEAE | | | | | | |
| <i>Rhododendron simsii</i> Planch. | azaleia | V | arb | | c | |
| ERYTHROXYLACEAE | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------|------|------|---|
| <i>Erythroxylum cuspidifolium</i> Mart. | fruta-de-pomba | GP | avt | n | |
| <i>Erythroxylum deciduum</i> A.St.-Hil. | cocão | GP, H | árv | n | |
| EUPHORBIACEAE | | | | | |
| <i>Alchornea sidifolia</i> Müll.Arg. | tapiá-guaçu | GP, H | árv | n | X |
| <i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg. | tapiá-mirim | AD, GP, H | árv | n | |
| <i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A.Juss. | cróton | V | avt | c | |
| <i>Croton floribundus</i> Spreng. | capixingui | AD, GP, H | árv | n | X |
| <i>Croton fuscescens</i> Spreng. | calção-de-velha | GP, H | arb | n | |
| <i>Dalechampia</i> sp. | | H | tr | n | |
| <i>Gymnanthes klotzschiana</i> Müll.Arg. | branquinho, pitanga-brava | AD, GP, H | árv | n | |
| <i>Tetrorchidium rubrivenium</i> Poepp. | canemaçu | GP, H | árv | n | |
| FABACEAE | | | | | |
| <i>Acacia mearnsii</i> De Wild. | acácia-negra | H | árv | c | |
| <i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenan | angico | GP, H | árv | n | |
| <i>Andira fraxinifolia</i> Benth. | angelim-doce, angelim-pintado | AD | árv | n | |
| <i>Bauhinia purpurea</i> L. | pata-de-vaca | H | avt | c | |
| <i>Bauhinia variegata</i> L. | unha-de-vaca | V | avt | c | |
| <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth | feijão-guandu | H | arb | s | |
| <i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC. | canafistula | GP, H | árv | n | |
| <i>Crotalaria pallida</i> Aiton | guizo-de-cascavel | H | suba | n | |
| <i>Dalbergia frutescens</i> (Vell.) Britton | açapuva | AD | árv | n | |
| <i>Erythrina falcata</i> Benth. | mulungu | GP, H | árv | n | |
| <i>Indigofera suffruticosa</i> Mill. | anil | GP, H | arb | n | |
| <i>Inga marginata</i> Willd. | ingá-dedo, ingá-feijão | GP | árv | n | |
| <i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart. | ingá-ferradura, ingá-macaco | GP, H | árv | n | |
| <i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz | pau-ferro | V | árv | c | X |
| <i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth. | bico-de-pato | AD, GP, H | árv | n | |
| <i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis | pau-brasil | V | árv | ENBR | c |
| <i>Piptadenia adiantoides</i> (Spreng.) J.F.Macbr. | | H | tr | n | |
| <i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr. | pau-jacaré | AD, GP, H | árv | n | X |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------|----------|---------------|---|---|
| <i>Platymiscium floribundum</i> Vogel | sacambu | GP, H | árv | | n | |
| <i>Poincianella pluviosa</i> (DC.) L.P.Queiroz var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) L.P.Queiroz | sibipiruna | V | árv | | c | x |
| <i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake | guapuruvu | H | árv | | n | |
| <i>Senegalia lowei</i> (L.Rico) Seigler & Ebinger | arranha-gato, acácia-de-espinho | GP, H | tr | | n | |
| <i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby | manduirana | GP, H | avt | | n | |
| <i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby | aleluia | GP, H | árv | | n | |
| <i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby | canudo-de-pito | GP, H | arb, avt | | n | |
| <i>Tachigali denudata</i> (Vogel) Oliveira-Filho | passuaré | AD, GP, H | árv | | n | x |
| <i>Trifolium repens</i> L. | | H | era | | c | |
| HELICONIACEAE | | | | | | |
| <i>Heliconia farinosa</i> Raddi | helicônia, bananeirinha | V | eriz | | n | |
| HYPOXIDACEAE | | | | | | |
| <i>Curculigo capitulata</i> (Lour.) Kuntze | curcúlico, capim-palmeira | V | eriz | | c | |
| LAMIACEAE | | | | | | |
| <i>Aegiphila obducta</i> Vell. | | GP, H | avt | | n | |
| <i>Hyptis radicans</i> (Pohl) Harley & J.F.B.Pastore | paracari, hortelã-do-mato | H | era | | n | |
| <i>Mesosphaerum sidifolium</i> (L'Hér.) Harley & J.F.B.Pastore | hortelã-brava | H | ee | | n | |
| <i>Salvia splendens</i> Sellow ex Roem. & Schult. | sálvia, alegria-dos-jardins | H | ee | | n | |
| <i>Vitex polygama</i> Cham. | tarumã, tarumã-do-cerrado | AD | árv | | n | |
| LAURACEAE | | | | | | |
| <i>Aiouea saligna</i> Meisn. | canela-anhoíba | GP, H | árv | | n | x |
| <i>Aniba viridis</i> Mez | | AD | árv | | n | |
| <i>Cinnamomum stenophyllum</i> (Meisn.) Vattimo-Gil | canela-vassoura | GP, H | árv | | n | |
| <i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr. | canela-peluda | AD, GP, H | árv | | n | |
| <i>Nectandra barbellata</i> Coe-Teix. | canela-amarela | GP, H | árv | VUBR, VUSP | n | x |
| <i>Nectandra oppositifolia</i> Nees | canela-ferrugem | GP, H | árv | | n | |
| <i>Ocotea brachybotrya</i> (Meisn.) Mez | canela-tatu | AD, GP, H | avt | | n | |

| | | | | | | |
|--|--------------------|-----------|------|---------------|---|---|
| <i>Ocotea corymbosa</i> (Meisn.) Mez | canela-preta | AD, GP | árv | | n | |
| <i>Ocotea dispersa</i> (Nees & Mart.) Mez | canelinha | AD, GP, H | árv | | n | |
| <i>Ocotea elegans</i> Mez | canela-broto | GP, H | árv | | n | |
| <i>Ocotea lanata</i> (Nees & Mart.) Mez | canela-lanosa | GP, H | árv | | n | |
| <i>Ocotea odorifera</i> (Vell.) Rohwer | canela-sassafrás | GP, H | árv | ENBR, ENSP | n | x |
| <i>Ocotea pulchra</i> Vattimo-Gil | canela | AD | árv | | n | |
| <i>Ocotea silvestris</i> Vattimo-Gil | | AD | árv | | n | |
| <i>Ocotea teleiandra</i> (Meisn.) Mez | canela-poca | AD, GP, H | árv | | n | |
| <i>Ocotea venulosa</i> (Nees) Baitello | | AD | árv | | n | |
| <i>Persea americana</i> Mill. | abacateiro | V | árv | | s | |
| LOGANIACEAE | | | | | | |
| <i>Strychnos brasiliensis</i> Mart. | salta-martinho | GP, H | ae | | n | |
| LORANTHACEAE | | | | | | |
| <i>Struthanthus flexicaulis</i> (Mart. ex Schult.f.) Mart. | erva-de-passarinho | H | hp | | n | |
| <i>Struthanthus martianus</i> Dettke & Waechter | erva-de-passarinho | H | hp | | n | |
| <i>Struthanthus polyrhizus</i> (Mart.) Mart. | erva-de-passarinho | H | hp | | n | |
| LYTHRACEAE | | | | | | |
| <i>Cuphea carthagagenensis</i> (Jacq.) J.F.Macbr. [sin. <i>Cuphea balsamona</i> Cham. & Schltl.] | sete-sangrias | H | suba | | n | |
| <i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil. | dedaleira | GP, H | avt | | n | |
| MALPIGHIAEAE | | | | | | |
| <i>Dicella bracteosa</i> (A.Juss.) Griseb. | castanha-de-cipó | H | tr | | n | |
| <i>Heteropterys intermedia</i> (A.Juss.) Griseb. | cipó-amarelo | H | tr | | n | |
| <i>Tetrapteryx mucronata</i> Cav. | | H | tr | | n | |
| MALVACEAE | | | | | | |
| <i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna | paineira | V | árv | | n | x |
| <i>Corchorus hirtus</i> L. | juta, malva-té | H | suba | | n | |
| <i>Malvaviscus arboreus</i> Cav. | malvavisco | H | arb | | s | |
| <i>Pavonia nemoralis</i> A.St.-Hil. | | GP, H | suba | | n | |
| <i>Pavonia sepium</i> A.St.-Hil. | | GP | arb | | n | |
| <i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns | embiruçu | GP, H | árv | | n | x |
| <i>Sida planicaulis</i> Cav. | guanxuma | H | arb | | n | |
| <i>Sida rhombifolia</i> L. | guanxuma-preta | H | suba | | n | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------|------|---------------|---|---|
| <i>Talipariti tiliaceum</i> (L.) Fryxell | algodão-da-praia | V | avt | | c | |
| <i>Triumfetta semitriloba</i> Jacq. | carrapicho | GP, H | arb | | n | |
| MARANTACEAE | | | | | | |
| <i>Ctenanthe lanceolata</i> Petersen | caeté | H | eriz | | n | |
| <i>Goeppertia</i> sp. | caetê | H | eriz | | n | |
| MELASTOMATACEAE | | | | | | |
| <i>Leandra fragilis</i> Cogn. | cambará-do-mato, pixirica | H | suba | | n | |
| <i>Leandra melastomoides</i> Raddi | cambará-do-mato, pixirica | GP, H | arb | | n | |
| <i>Leandra sericea</i> DC. | | GP, H | arb | | n | |
| <i>Leandra variabilis</i> Raddi | pixirica | GP, H | arb | | n | |
| <i>Leandra xanthocoma</i> (Naudin) Cogn. | pixirica | H | arb | | n | |
| <i>Miconia cabucu</i> Hoehne | cabuçu | AD, GP, H | árv | | n | |
| <i>Miconia cubatanensis</i> Hoehne | jacatirão-mirim | GP, H | árv | | n | |
| <i>Miconia petropolitana</i> Cogn. | jacatirão-mirim | GP, H | árv | | n | |
| <i>Miconia theizans</i> (Bonpl.) Cogn. | jacatirão, urucurana- branca | AD | arb | | n | |
| <i>Miconia valtheri</i> Naudin | | GP, H | árv | | n | |
| <i>Ossaea confertiflora</i> (DC.) Triana | pixirica | GP, H | arb | | n | |
| <i>Ossaea meridionalis</i> D'El Rei Souza | pixirica | H | arb | | n | |
| <i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don | quaresmeira | V | árv | | c | |
| <i>Tibouchina pulchra</i> Cogn. | manacá-da-serra | GP, H | árv | | n | |
| <i>Tibouchina sellowiana</i> Cogn. | quaresmeira-da-serra | GP, H | avt | | n | |
| MELIACEAE | | | | | | |
| <i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. subsp. <i>canjerana</i> | canjerana | AD, GP, H | árv | | n | |
| <i>Cedrela fissilis</i> Vell. | cedro | AD, GP, H | árv | VUBR, VUSP | n | x |
| <i>Trichilia emarginata</i> (Turcz.) C.DC. | | AD | árv | | n | |
| MENISPERMACEAE | | | | | | |
| <i>Cissampelos andromorpha</i> DC. | | H | tr | | n | |
| <i>Odontocarya acuparata</i> Miers | | H | tr | | n | |
| MONIMIACEAE | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|---------|---------------|---|---|
| <i>Mollinedia schottiana</i> (Spreng.) Perkins | espinheira-santa, guatambu-langanha | AD, GP | avt | | n | |
| <i>Mollinedia triflora</i> (Spreng.) Tul. | capixim | AD, GP, H | avt | | n | |
| MORACEAE | | | | | | |
| <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam. | jaqueira | V | árv | | s | |
| <i>Ficus adhatodifolia</i> Schott | figueira-branca | AD, GP, H | árv | | n | x |
| <i>Ficus benjamina</i> L. | figueira-benjamim | V | árv | | c | |
| <i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq. | figueira, figueira-mata-pau | GP, H | he, árv | | n | |
| <i>Ficus organensis</i> (Miq.) Miq. | gameleira-brava | GP, H | árv | | n | |
| <i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W.C.Burger, Lanj. & Wess. Boer | cega-olho, espinheira-santa | AD, GP, H | árv | | n | |
| MUSACEAE | | | | | | |
| <i>Musa x paradisiaca</i> L. | bananeira | H | eriz | | s | |
| MYRISTICACEAE | | | | | | |
| <i>Virola bicuhyba</i> (Schott ex Spreng.) Warb. | bicuíba | AD | árv | ENBR, ENSP | n | x |
| MYRTACEAE | | | | | | |
| <i>Calyptranthes grandifolia</i> O.Berg | guamirim-araçá | AD, GP, H | avt | | n | |
| <i>Calyptranthes lucida</i> Mart. ex DC. | | AD | árv | | n | |
| <i>Campomanesia</i> sp. | | V | avt | | n | |
| <i>Eucalyptus tereticornis</i> Sm. | eucalipto | H | árv | | c | |
| <i>Eugenia beaurepairiana</i> (Kiaersk.) D.Legrand | | V | árv | | n | |
| <i>Eugenia cerasiflora</i> Miq. | guamirim | GP, H | avt | | n | |
| <i>Eugenia dodonaeifolia</i> Cambess. | | AD | árv | | n | |
| <i>Eugenia excelsa</i> O.Berg | | AD, GP, H | árv | | n | |
| <i>Eugenia uniflora</i> L. | pitangueira | GP, H | avt | | n | x |
| <i>Eugenia verticillata</i> (Vell.) Angely | guamirim | AD, V | árv | | n | |
| <i>Eugenia</i> sp. | | AD | árv | | n | |
| <i>Myrceugenia campestris</i> (DC.) D.Legrand & Kausel | | GP | árv | | n | |
| <i>Myrceugenia myrcioides</i> (Cambess.) O.Berg | | V | árv | | n | |
| <i>Myrcia aethusa</i> (O.Berg) N.Silveira | | AD, GP, H | árv | | n | |
| <i>Myrcia anacardiifolia</i> Gardner | guamirim | AD, GP, H | avt | | n | |

| | | | | VUBR, VUSP | n | x |
|---|------------------------|-----------|-----|---------------|---|---|
| <i>Myrcia diaphana</i> (O.Berg) N.Silveira | | AD | árv | | | |
| <i>Myrcia hebe petala</i> DC. | | AD | avt | | n | |
| <i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC. | cambuizinho | GP, H | avt | | n | x |
| <i>Myrcia pubipetala</i> Miq. | guamirim | AD, GP, H | árv | | n | |
| <i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC. | cumaté, guamirim | AD | árv | | n | |
| <i>Myrcia tenuivenosa</i> Kiaersk. | | AD | árv | | n | |
| <i>Myrcia tijucensis</i> Kiaersk. | guamirim-ferro | AD, GP, H | árv | | n | |
| <i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg | cambuí | AD, GP, H | avt | | n | |
| <i>Myrciaria glomerata</i> O.Berg | cabeludinha | AD | avt | | c | |
| <i>Neomitranthes glomerata</i> (D.Legrand) D.Legrand | | AD | árv | | n | |
| <i>Plinia anonyma</i> Sobral | | GP, H | avt | | n | |
| NYCTAGINACEAE | | | | | | |
| <i>Bougainvillea</i> sp. | primavera, três-marias | V | tr | | n | |
| <i>Guapira nitida</i> (Mart. ex J.A.Schmidt) Lundell | | AD, GP, H | avt | VUSP | n | x |
| <i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz | maria-mole | AD, GP, H | árv | | n | |
| OCHNACEAE | | | | | | |
| <i>Ouratea parviflora</i> (A.DC.) Baill. | guatinga | AD, GP, H | avt | | n | |
| OLACACEAE | | | | | | |
| <i>Heisteria sylvianii</i> Schwacke | gumbivoja, rapadura | AD, GP | árv | | n | |
| OLEACEAE | | | | | | |
| <i>Chionanthus trichotomus</i> (Vell.) P.S.Green | limoeiro-do-mato | AD, GP | avt | | n | |
| <i>Jasminum mesnyi</i> Hance | jasmim-amarelo | V | ae | | c | |
| <i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton | alfeneiro | V | árv | | c | |
| ONAGRACEAE | | | | | | |
| <i>Ludwigia elegans</i> (Cambess.) H.Hara | cruz-de-malta | H | ee | | n | |
| ORCHIDACEAE | | | | | | |
| <i>Notylia stenantha</i> Rchb.f. | orquídea | H | ep | | n | |
| <i>Vanilla edwallii</i> Hoehne | orquídea | H | tr | | n | |
| PASSIFLORACEAE | | | | | | |
| <i>Passiflora alata</i> Curtis | maracujá-doce | H | tr | | n | |
| <i>Passiflora porophylla</i> Vell. | maracujazinho | H | tr | | n | |
| PERACEAE | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|------|--|---|--|
| <i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill. | pau-de-tamanco, sapateiro | GP, H | árv | | n | |
| PHYTOLACCACEAE | | | | | | |
| <i>Seguieria langsdorffii</i> Moq. | limoeiro-do-mato | GP, H | árv | | n | |
| PIPERACEAE | | | | | | |
| <i>Peperomia catharinae</i> Miq. | | H | ep | | n | |
| <i>Piper gaudichaudianum</i> Kunth | jaborandi | AD, GP | arb | | n | |
| <i>Piper hispidum</i> Sw. | jaborandi | H | arb | | n | |
| <i>Piper malacophyllum</i> (C.Presl) C.DC. | jaborandi | H | arb | | n | |
| <i>Piper miquelianum</i> C.DC. | jaborandi | GP, H | arb | | n | |
| <i>Piper rivinoides</i> Kunth | jaborandi | H | arb | | n | |
| <i>Piper solmsianum</i> C.DC. var. <i>solmsianum</i> | jaborandi | GP | arb | | n | |
| POACEAE | | | | | | |
| <i>Cenchrus purpureus</i> (Schumach.) Morrone | capim-elefante, capim-napiê | H | eriz | | s | |
| <i>Chusquea capituliflora</i> Trin. | taboca | GP, H | tr | | n | |
| <i>Lasiacis divaricata</i> (L.) Hitchc. | | GP | ed | | n | |
| <i>Melinis minutiflora</i> P.Beauv. | capim-gordura | H | eriz | | s | |
| <i>Parodiolyra micrantha</i> (Kunth) Davidse & Zuloaga | taquari, criciúma | H | eces | | n | |
| <i>Pharus lappulaceus</i> Aubl. | | V | eces | | n | |
| <i>Urochloa mutica</i> (Forssk.) T.Q.Nguyen | braquiária | H | ed | | s | |
| POLYGONACEAE | | | | | | |
| <i>Coccoloba warmingii</i> Meisn. | cauaçu | AD, GP | árv | | n | |
| PRIMULACEAE | | | | | | |
| <i>Myrsine umbellata</i> Mart. | capororoca | AD | árv | | n | |
| <i>Myrsine venosa</i> A.DC. | capororoca | AD | avt | | n | |
| PROTEACEAE | | | | | | |
| <i>Grevillea banksii</i> R.Br. | grevílea-vermelha, grevílea-anã | V | avt | | c | |
| <i>Roupala montana</i> Aubl. var. <i>brasiliensis</i> (Klotzsch) K.S.Edwards | canjica, carne-de-vaca | GP, H | árv | | n | |
| ROSACEAE | | | | | | |
| <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl. | nespereira | H | avt | | s | |
| <i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb. | pessegueiro-bravo | AD, GP, H | árv | | n | |
| <i>Rubus rosifolius</i> Sm. | framboesa-silvestre | H | ee | | n | |

| RUBIACEAE | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------|-----|--|---|--|
| <i>Amaiba intermedia</i> Mart. ex Schult. & Schult.f. | café-de-bugre, guapiricica | AD, GP, H | árv | | n | |
| <i>Bathysa australis</i> (A.St.-Hil.) K.Schum. | caá-açu, orelha-de- elefante | GP, H | árv | | n | |
| <i>Coffea arabica</i> L. | cafeeiro | V | avt | | s | |
| <i>Cordiera myrciifolia</i> (K.Schum.) H.C.Perss. & Delporte var. <i>myrciifolia</i> | marmelinho | AD, GP, H | avt | | n | |
| <i>Ixora</i> sp. | | H | avt | | n | |
| <i>Manettia gracilis</i> Cham. & Schltdl. | | H | tr | | n | |
| <i>Margaritopsis cephalantha</i> (Müll.Arg.) C.M.Taylor | erva-de-rato | AD, GP, H | arb | | n | |
| <i>Palicourea marcgravii</i> A.St.-Hil. | erva-de-rato | GP, H | arb | | n | |
| <i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Schult. | fruta-de-macaco | GP, H | árv | | n | |
| <i>Psychotria forsteronioides</i> Müll.Arg. | | GP, H | arb | | n | |
| <i>Psychotria ruelliifolia</i> (Cham. & Schltdl.) Müll.Arg. | erva-de-rato | H | arb | | n | |
| <i>Psychotria suterella</i> Müll.Arg. | cafezinho-roxo-da-mata, pixirica | AD, GP, H | avt | | n | |
| <i>Psychotria vellosiana</i> Benth. | erva-de-rato-de-folhas- estreitas | AD, GP, H | avt | | n | |
| <i>Randia armata</i> (Sw.) DC. | jasmim-do-mato, limão- do-mato | GP, H | árv | | n | |
| <i>Rudgea jasminoides</i> (Cham.) Müll.Arg. | jasmim-do-mato | AD, GP, H | árv | | n | |
| RUTACEAE | | | | | | |
| <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck | limoeiro, limão-cravo | H | avt | | s | |
| <i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack | jasmim-laranja, falsa- murta | V | avt | | c | |
| <i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam. | mamica-de-porca | AD, H | árv | | n | |
| SALICACEAE | | | | | | |
| <i>Casearia decandra</i> Jacq. | cafezinho-do-mato, guaçatonga | AD | árv | | n | |
| <i>Casearia sylvestris</i> Sw. | guaçatonga, erva-de- lagarto | AD, GP, H | árv | | n | |
| <i>Xylosma glaberrima</i> Sleumer | açucará-manso | AD, GP, H | árv | | n | |
| SANTALACEAE | | | | | | |
| <i>Phoradendron crassifolium</i> (Pohl ex DC.) Eichler | erva-de-passarinho | H | hp | | n | |

| SAPINDACEAE | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------|-----------------------|--|---|---|
| <i>Allophylus petiolulatus</i> Radlk. | fruta-de-pombo, guairana | GP, H | avt | | n | |
| <i>Cupania oblongifolia</i> Mart. | camboatá-de-folhas-largas | AD, GP, H | árvores | | n | |
| <i>Cupania vernalis</i> Cambess. | camboatá, arco-de-peneira | AD | árvores | | n | |
| <i>Matayba guianensis</i> Aubl. | camboatá, mataíba | GP, H | avt | | n | |
| <i>Serjania communis</i> Cambess. | timbó-miúdo | H | tr | | n | |
| <i>Serjania laruotteana</i> Cambess. | cipó-timbó-açu, cipó-uva | H | tr | | n | |
| <i>Serjania multiflora</i> Cambess. | timbó | H | tr | | n | |
| <i>Urvillea ulmacea</i> Kunth | cipó-timbó | H | tr | | n | |
| SAPOTACEAE | | | | | | |
| <i>Ecclinusa ramiflora</i> Mart. | maçaranduba | GP, H | árvores | | n | |
| SCROPHULARIACEAE | | | | | | |
| <i>Buddleja stachyoides</i> Cham. & Schlecht. | barbasco, calção-de-velha | GP, H | arbustos | | n | |
| SMILACACEAE | | | | | | |
| <i>Smilax elastica</i> Griseb. | japecanga | H | tr | | n | |
| SOLANACEAE | | | | | | |
| <i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schlecht. | fruta-de-sabiá, marianeira | GP, H | arbustos | | n | x |
| <i>Aureliana fasciculata</i> (Vell.) Sendtn. | | H | avt | | n | |
| <i>Aureliana picta</i> (Mart.) I.M.C.Rodrigues & Stehmann | | GP, H | arbustos | | n | |
| <i>Brunfelsia pauciflora</i> (Cham. & Schlecht.) Benth. | manacá-de-cheiro | GP, H | arbustos, avt | | n | |
| <i>Cestrum schlechtendalii</i> G.Don | coerana | GP, H | arbustos | | n | |
| <i>Solanum americanum</i> Mill. | erva-moura, maria-pretinga | H | subarbustos | | n | |
| <i>Solanum bullatum</i> Vell. | capoeira-branca | GP | árvores | | n | |
| <i>Solanum granulosoleprosum</i> Dunal | cuvitinga, fumo-bravo | GP, H | árvores | | n | |
| <i>Solanum inodorum</i> Vell. | | H | árvores | | n | |
| <i>Solanum pseudocapsicum</i> L. | tomatinho | GP, H | arbustos, subarbustos | | n | |
| <i>Solanum pseudoquina</i> A.St.-Hil. | quina-de-são-paulo | GP, H | árvores | | n | |

| | | | | | |
|---|---|-----------|------|---------------|---|
| <i>Solanum scuticum</i> M.Nee | jurubeba | GP, H | avt | n | |
| <i>Solanum swartzianum</i> Roem. & Schult. | pratinha | GP, H | árv | n | |
| <i>Solanum variabile</i> Mart. | jurubeba-falsa | GP, H | arb | n | |
| SYMPLOCACEAE | | | | | |
| <i>Symplocos laxiflora</i> Benth. | | GP | avt | n | |
| THEACEAE | | | | | |
| <i>Laplacea fruticosa</i> (Schrad.) Kobuski | chazeiro-da-terra | GP, H | árv | n | |
| TROPAEOLACEAE | | | | | |
| <i>Tropaeolum majus</i> L. | capuchinha, chagas | H | era | s | |
| URTICACEAE | | | | | |
| <i>Cecropia glaziovii</i> Snethl. | embaúba-vermelha | GP | árv | n | |
| <i>Cecropia hololeuca</i> Miq. | embaúba-prateada | AD, GP, H | árv | n | |
| <i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & Guillaumin | alumínio, pileia | V | ee | s | |
| VERBENACEAE | | | | | |
| <i>Citharexylum myrianthum</i> Cham. | tarumã-branco, pimenteira | AD | árv | n | |
| <i>Lantana camara</i> L. | cambará, lantana | GP, H | arb | n | |
| VOCHysiaceae | | | | | |
| <i>Qualea selloi</i> Warm. | pau-terra | GP, H | árv | n | X |
| <i>Vochysia magnifica</i> Warm. | vinheiro | GP, H | árv | n | X |
| <i>Vochysia tucanorum</i> Mart. | pau-de-tucano | H | árv | n | |
| WINTERACEAE | | | | | |
| <i>Drimys brasiliensis</i> Miers | casca-d'anta, paratudo | GP, H | avt | n | |
| ZINGIBERACEAE | | | | | |
| <i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. | colônia | V | eriz | c | |
| GIMNOSPERMAS | | | | | |
| ARAUCARIACEAE | | | | | |
| <i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze | pinheiro-do-paraná | GP, H | árv | ENBR, ENSP | n |
| CUPRESSACEAE | | | | | |
| <i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich. | pinheiro-do-brejo, cipreste-vermelho | H | árv | c | |
| PODOCARPACEAE | | | | | |
| <i>Podocarpus sellowii</i> Klotzsch ex Endl. | pinheiro-bravo | GP, H | árv | n | |

| PTERIDÓFITAS | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------|------|--|---|--|--|
| ANEMIACEAE | | | | | | | |
| <i>Anemia phyllitidis</i> (L.) Sw. | | H | eces | | n | | |
| CYATHEACEAE | | | | | | | |
| <i>Cyathea delgadii</i> Sternb. | samambaiaçu | AD, GP, H | fa | | n | | |

Referências bibliográficas e levantamentos

- ARAGAKI, S. 2017. Composição florística e estrutura de cinco fragmentos florestais urbanos no município de São Paulo (SP, Brasil). Tese de Doutorado. I.Botânica. São Paulo.
- GARCIA, R.J.F. & PIRANI, J.R. 2001. Estudo florístico dos componentes arbóreo e arbustivo da mata do Parque Santo Dias, São Paulo, SP, Brasil. Bol. Bot. Univ. São Paulo 19: 15-42.

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

AD: Aragaki (2017); GP: Garcia & Pirani (2001); H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

ae: arbusto escandente
 arb: arbusto
 árv: árvore ($\geq 4m$)
 avt: arvoreta ($< 4m$)
 b: bambusoide
 ca: cactácea arborescente, colunar, articulada
 cic: cicadoide
 dr: dracenoide ou agavoide
 ea: erva aquática
 eb: erva com bulbos, cormos ou túberas
 eces: erva cespitosa
 ed: erva decumbente
 ee: erva ereta

ep: epífita
era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera
eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal
eros: erva rosulada
esap: erva saprófita
esuc: erva suculenta
ex: erva com xilopódio
fa: feto arborescente
he: hemiepífita
hp: hemiparasita
par: parasita
pa: palmeira 'acaule'
pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitzias
pu: palmeira estipe único
suba: subarbusto
sx: subarbusto com xilopódio
tr: trepadeira
o: outros

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo
EN em perigo
EW extinta na natureza
EX presumivelmente extinta
VU vulnerável
acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA nº 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)
vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo
c: exótica cultivada

s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas na versão impressa