

GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
ANGIOSPERMAS						
AMARANTHACEAE						
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	bredo-d'água	H	ed		n	
<i>Alternanthera</i> sp.		H	ee		n	
<i>Amaranthus blitum</i> L.	caruru	H	era		s	
<i>Amaranthus hybridus</i> L.	caruru-bravo	H	ee		s	
<i>Amaranthus spinosus</i> L.	caruru-de-espinho	H	ee		s	
<i>Chenopodium album</i> L.	falsa-erva-de-santa-maria	H	ee		n	
ANACARDIACEAE						
<i>Mangifera indica</i> L.	mangueira	V	árvo		s	
<i>Schinus molle</i> L.	aroeira-salsa	H	avt		c	x
<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	aroeira-mansa	V	árvo		n	x
ANNONACEAE						
<i>Annona</i> sp.		H	árvo			
APIACEAE						
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	erva-doce, funcho	H	ee		s	
APOCYNACEAE						
<i>Asclepias curassavica</i> L.	erva-de-rato, oficial-de-sala	H	ee		n	
ARACEAE						
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> Schott	guaimbé, costela-de-adão	V	he		n	

GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
ARALIACEAE						
<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	árvore-polvo	V	árv		c	
<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Merr.	cheflera	V	arb		c	
ARECACEAE						
<i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude	seafórtia	V	pu		s	
<i>Dypsis lutescens</i> (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.	areca-bambu	V	pc		c	
<i>Dypsis madagascariensis</i> (Becc.) Beentje & J.Dransf.	areca-de-lucuba	V	pu		c	
<i>Roystonea</i> sp.	palmeira-imperial	V	pu		c	X
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	jerivá	V	pu		n	X
ASPARAGACEAE						
<i>Dracaena marginata</i> Hort.	dracena	V	dr		c	
<i>Furcraea selloa</i> K.Koch	piteira	V	dr		c	
<i>Yucca</i> sp.	iúca	V	dr		c	
ASTERACEAE						
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	losna-brava	H	eriz		s	
<i>Bidens pilosa</i> L.	picão-preto	H	ee		s	
<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	picão-branco, botão-de-ouro	H	ee		s	
<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav.		H	ee		s	
<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	losna-branca, coentro-do-mato	H	ee		s	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	serralha	H	eros		n	
<i>Symphyotrichum squamatum</i> (Spreng.) G.L.Nesom		H	suba		n	

Parque Linear Tiquatira - Engenheiro Werner Eugênio Zulauf. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020	GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
<i>Vernonanthura polyanthes</i> (Spreng.) A.J.Vega & Dematt.		assa-peixe	V	avt		n	
BIGNONIACEAE							
<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos		ipê-amarelo	V	avt		n	
<i>Handroanthus heptaphyllum</i> (Vell.) Mattos		ipê-rosa, ipê-roxo	V	árv		n	
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don		jacarandá-mimoso	V	árv		c	
<i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv.		espatódea	V	árv		c	
<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.		ipê-de-el-salvador	V	árv		c	X
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith		ipê-branco	V	avt		c	
<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth		ipê-de-jardim	V	avt		s	
BORAGINACEAE							
<i>Cordia myxa</i> L.		córdia-africana	V	árv		c	X
BRASSICACEAE							
<i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm.		mastruço, mentruz	H	era		n	
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.		nabo, nabiça	H	ee		s	
<i>Raphanus sativus</i> L.		nabo	H	ee		c	
CHRYSOBALANACEAE							
<i>Licania tomentosa</i> (Benth.) Fritsch		oiti	V	árv		c	
CLEOMACEAE							
<i>Tarenaya spinosa</i> (Jacq.) Raf.		mussambê	H	suba		n	
COMBRETACEAE							
<i>Terminalia catappa</i> L.		chapéu-de-sol	V	árv		c	X
CONVOLVULACEAE							
<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet		ipomeia, jitirana	H	tr		n	

GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
<i>Ipomoea</i> sp.		V	tr		n	
CYPERACEAE						
<i>Cyperus alternifolius</i> L.	sombrinha-chinesa	H	eces		s	
<i>Cyperus esculentus</i> L.	tiririca-amarela	H	era		n	
<i>Cyperus rotundus</i> L.	tiririca-vermelha, capim-alho	H	era		n	
EUPHORBIACEAE						
<i>Aleurites moluccanus</i> (L.) Willd.	nogueira-de-iguape	H	árv		c	
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	capixingui	V	árv		n	
<i>Croton urucurana</i> Baill.	urucurana, sangrad'água	V	árv		n	
<i>Euphorbia heterophylla</i> L.	amendoim-bravo, leiteira	H	ee		n	
<i>Euphorbia leucocephala</i> Lotsy	cabeça-branca	V	avt		c	
<i>Ricinus communis</i> L.	mamona	V	avt		s	
FABACEAE						
<i>Acacia mearnsii</i> De Wild.	acácia-negra	V	árv		c	
<i>Acacia podalyriifolia</i> A.Cunn. ex G.Don	acácia-mimosa	V	avt		c	
<i>Bauhinia purpurea</i> L.	pata-de-vaca	V	avt		c	
<i>Bauhinia variegata</i> L. var. <i>candida</i> Voigt	unha-de-vaca	V	avt		c	
<i>Bauhinia variegata</i> L. var. <i>variegata</i>	unha-de-vaca	V	avt		c	
<i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth	feijão-guandu	V	arb		s	
<i>Calliandra brevipes</i> Benth.	cabelo-de-anjo	V	arb		n	

GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
<i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC.	canafistula	V	árv		n	
<i>Cassia grandis</i> L.f.	canafistula	V	árv		c	
<i>Cenostigma pluviosum</i> (DC.) E.Gagnon & G.P.Lewis var. <i>peltophoroides</i> (Benth.) E.Gagnon & G.P.Lewis	sibipiruna	V	árv		c	
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	araribá-rosa	V	árv		n	X
<i>Clitoria fairchildiana</i> R.A.Howard	sombreiro	V	árv		c	
<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	flamboiã	V	árv		c	
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	timboúva, tamboril	V	árv		c	x
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	corticeira, crista-de-galo	V	árv		n	
<i>Erythrina falcata</i> Benth.	mulungu	V	árv		n	
<i>Erythrina speciosa</i> Andrews	suinã	V	avt		n	
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	jatobá	V	árv		n	
<i>Inga vera</i> Willd. subsp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Penn.	ingá	H	árv		n	
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	leucena, lantoro	V	avt		s	
<i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. <i>leiostachya</i> (Benth.) L.P.Queiroz	pau-ferro	V	árv		c	
<i>Parapiptadenia rigida</i> (Benth.) Brenan	angico-guarucaia	V	árv		n	
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima, G.P.Lewis	pau-brasil	H	árv	ENBR	c	X
<i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.	faveira, sobrasil	V	árv		n	
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	pau-jacaré	V	árv		n	
<i>Poecilanthe parviflora</i> Benth.	canela-de-brejo	V	árv		c	

GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl	aldrago, folha-larga	V	árv		n	
<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake	guapuruvu	V	árv		n	X
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	manduirana	V	avt		n	
<i>Senna multijuga</i> (Rich.) H.S.Irwin & Barneby	aleluia	V	árv		n	
<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	cambuí	V	avt		n	
<i>Tipuana tipu</i> (Benth.) Kuntze	tipuana	V	árv		c	X
LAMIACEAE						
<i>Callicarpa reevesii</i> Wall. ex Walp.	calicarpa	V	árv		c	
<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.	rubim, cordão-de-são-francisco	H	ee		s	
<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews	boldo-brasileiro, boldo-felpudo	V	suba		c	
LAURACEAE						
<i>Persea americana</i> Mill.	abacateiro	V	árv		s	
LYTHRACEAE						
<i>Lafoensia glyptocarpa</i> Koehne	dedaleira, mirindiba-rosa	V	árv		c	
<i>Lafoensia pacari</i> A.St.-Hil.	dedaleira	V	avt		n	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	resedá	V	avt		c	
MAGNOLIACEAE						
<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	magnólia-amarela	V	árv		c	
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	magnólia-branca	V	árv		c	
MALVACEAE						

GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
<i>Ceiba speciosa</i> (A.St.-Hil.) Ravenna	paineira	V	árv		n	X
<i>Dombeya wallichii</i> (Lindl.) Baill.	astrapeia	V	avt		c	
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	mutambo	V	árv		d	X
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	hibisco	V	arb		c	
<i>Luehea</i> sp.	açoita-cavalo	V	árv		n	
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	malvavisco	V	arb		s	
<i>Pachira aquatica</i> Aubl.	castanheira-das-guianas	V	árv		c	
<i>Pachira glabra</i> Pasq.	castanha-do-maranhão	V	avt		d	
<i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns	embiruçu	V	árv		n	
<i>Sida rhombifolia</i> L.	guanxuma-preta	H	suba		n	
MELASTOMATACEAE						
<i>Pleroma granulosum</i> (Desr.) D.Don	quaresmeira	V	árv		c	
<i>Tibouchina</i> sp.		V	arb		n	
MELIACEAE						
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	cedro	V	árv	VUBR, VUSP	n	X
MORACEAE						
<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	jaqueira	V	árv		s	
<i>Ficus benjamina</i> L.	figueira-benjamim	V	árv		c	X
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.	falsa-seringueira	V	árv		c	X

GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
<i>Ficus luschnathiana</i> (Miq.) Miq.	figueira, figueira-mata-pau	V	he, árv		n	
<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	falsa-figueira-benjamim, figueira-lacerdinha	V	árv		c	
<i>Ficus</i> sp.	figueira	V	árv		c	
<i>Morus nigra</i> L.	amoreira, amoreira-preta	V	avt		s	
MUNTINGIACEAE						
<i>Muntingia calabura</i> L.	calabura	H	avt		c	
MUSACEAE						
<i>Musa x paradisiaca</i> L.	bananeira	V	eriz		s	
MYRTACEAE						
<i>Callistemon</i> sp.		V	avt		c	
<i>Eucalyptus</i> sp.	eucalipto	V	árv		c	
<i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.	grumixama	V	avt		n	
<i>Eugenia involucrata</i> DC.	cerejeira-do-rio-grande, cereja-do-mato	V	árv		n	
<i>Eugenia myrcianthes</i> Nied.	pessegueiro-do-mato, ivaí	H	avt		c	
<i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.	uvaia	V	árv		n	
<i>Eugenia uniflora</i> L.	pitangueira	V	avt		n	

GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
<i>Plinia edulis</i> (Vell.) Sobral	cambucá	V	avt	VUBR, VUSP	c	X
<i>Plinia</i> sp.	jaboticabeira	V	árvo		d	
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	araçá-comum	V	avt		n	
<i>Psidium guajava</i> L.	goiabeira	V	avt		s	
<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	jambolão	V	árvo		s	
<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	jambeiro, jambo-amarelo	V	árvo		s	
OLEACEAE						
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfeneiro	V	árvo		c	
ONAGRACEAE						
<i>Ludwigia</i> sp.	cruz-de-malta	H	ee		n	
POACEAE						
<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. ex J.C.Wendl.	bambu-imperial	V	b		s	X
<i>Cynodon</i> sp.		H	eces		n	
<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	milhã, capim-colchão	H	ed		s	
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	capim-arroz	H	eces		s	
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	capim-pé-de-galinha	H	eces		s	
<i>Urochloa plantaginea</i> (Link) R.D.Webster	braquiária	H	eces		s	
POLYGONACEAE						
<i>Polygonum persicaria</i> L.	erva-de-bicho, cataia	H	ed		n	

GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	língua-de-vaca	H	ee		s	
<i>Triplaris americana</i> L.	pau-formiga, tripláris	V	árvo		c	
PROTEACEAE						
<i>Macadamia integrifolia</i> Maiden & Betche	macadâmia	H	avt		c	
ROSACEAE						
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	nespereira	V	avt		s	
<i>Prunus</i> sp.	cerejeira	H	avt		c	
<i>Pyracantha</i> sp.	piracanta	V	arb		c	
RUBIACEAE						
<i>Coffea arabica</i> L.	cafeeiro	V	avt		s	
<i>Genipa infundibuliformis</i> Zappi & Semir	jenipapo-liso	V	árvo		c	
RUTACEAE						
<i>Citrus</i> sp.	cítrus	V	avt		c	
<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	jasmim-laranja, falsa-murta	V	arb, avt		c	
SALICACEAE						
<i>Salix babylonica</i> L.	chorão, salgueiro	V	árvo		c	
<i>Salix</i> sp.		V	árvo		c	
SAPINDACEAE						
<i>Koelreuteria elegans</i> (Seem.) A.C.Sm.	pinange	V	árvo		c	
SOLANACEAE						

GRUPO / FAMÍLIA / Espécie	nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
<i>Acnistus arborescens</i> (L.) Schltdl.	fruta-de-sabiá, marianeira	V	arb		n	
<i>Solanum</i> sp.		V	arb		n	
URTICACEAE						
<i>Cecropia kavanayensis</i> Cuatrec.	embauába	V	árvo		c	
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	embauába-branca	V	árvo		n	
VERBENACEAE						
<i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.	tarumã-branco, pimenteira	V	árvo		n	
<i>Duranta erecta</i> L.	violeteira, pingode-ouro	V	arb		c	
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	fel-da-terra	H	ee		n	
GIMNOSPERMAS						
ARAUCARIACEAE						
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	pinheiro-do-paraná	V	árvo	ENBR, ENSP	n	x
<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	pinheiro-de-norfolk	V	árvo		c	
CUPRESSACEAE						
<i>Cupressus lusitanica</i> Mill.	cedro-de-bussaco	V	árvo		c	x
PINACEAE						
<i>Pinus elliottii</i> Engelm.	pínus, pinheiro-americano	V	árvo		s	
PODOCARPACEAE						

Parque Linear Tiquatira - Engenheiro Werner Eugênio Zulauf. Flora: última atualização do Herbário Municipal em 23/11/2020		nome popular	fonte de dados	habito	status de conservação	origem	guia
GRUPO / FAMÍLIA / Espécie							
<i>Podocarpus lambertii</i> Klotzsch ex Endl.		pinheiro-bravo	V	árv		c	

LEGENDA

FONTE DE DADOS:

H: amostra incluída no Herbário Municipal (PMSP); V: vistoria sem inclusão

HÁBITO:

arb: arbusto
árv: árvore ($\geq 4m$)
avt: arvoreta ($< 4m$)
b: bambusoide
dr: dracenoide ou agavoide
eces: erva cespitosa
ed: erva decumbente
ee: erva ereta
era: erva rastejante, reptante, sarmentosa, estolonífera
eriz: erva rizomatosa e pteridófitas c/ caule horizontal
eros: erva rosulada
he: hemiepífita
pc: palmeira estipe cespitoso, tb p/ strelitziás
pu: palmeira estipe único
suba: subarbusto
tr: trepadeira

STATUS DE CONSERVAÇÃO:

CR criticamente em perigo

EN em perigo

EW extinta na natureza

EX presumivelmente extinta

VU vulnerável

acrescido de BR para Brasil (BRASIL. 2014. Portaria MMA n° 443, de 17 de dezembro de 2014) e SP para o estado de São Paulo (SÃO PAULO (ESTADO) 2016. Resolução SMA - 57, de 5-6-2016. Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (120): 55-57)

vazio: não consta nas listas estadual e federal

ORIGEM:

n: nativa no município de São Paulo
c: exótica cultivada
d: dúvida se é nativa no MSP
s: exótica subespontânea

GUIA

X: citadas nos destaque