

www.prefeitura.sp.gov.br/covisa

COPA AMÉRICA 2019



**CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE**



**CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE**

Considerando:

- ▶ Que o Brasil será sede da **Copa América 2019**, no período **de 14 de junho a 07 de julho**, com sede em várias cidades do Brasil.
- ▶ A previsão para o evento é do Município de São Paulo (MSP) receber pessoas de todas as nacionalidades oriundas de países das Américas e algumas partes do mundo, incluindo países que estão com circulação do vírus do sarampo;
- ▶ Os intensos trânsitos internacionais, interestaduais e intraestadual de pessoas e torcedores;
- ▶ O **sarampo** ser uma **doença viral altamente transmissível**;
- ▶ A **circulação do vírus** ocorre em diferentes partes do mundo, como a **Europa, Ásia, Oceania e África, Américas**, inclusive **no Brasil**;
- ▶ A **vacina Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR)** ser a **forma mais eficaz de prevenção** contra o sarampo;
- ▶ A importância do esquema vacinal completo de todos os grupos eleitos para vacinação (considerar doses válidas apenas as doses registradas na caderneta de vacinação e com os intervalos recomendados);
- ▶ A vacina é oferecida gratuitamente em todas as salas de vacina da rede pública do MSP

Recomendamos:

Iniciar ou completar o esquema da vacina SCR, de acordo, com o calendário vacinal do Programa Municipal de Imunizações:

Crianças entre 1 ano e 29 anos de idade

- ▶ Todas as pessoas entre 1 e 29 anos de idade, devem ter duas doses da vacina SCR. Caso a pessoa apresente documentação com esquema de vacinação incompleto, é suficiente completar o esquema já iniciado. Para as crianças com **15 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias**, a segunda dose deverá ser aplicada a vacina Tetraviral, desde que já tenha recebido uma dose de tríplice viral, com intervalo mínimo de 30 dias.
- ▶ Para indivíduos sem comprovação de vacinação anterior, aplicar uma dose da vacina SCR na visita ao posto de vacinação e uma segunda dose respeitando intervalo mínimo de 30 dias entre elas.

Adultos entre 30 e nascidos a partir de 1960 (que em 2019 completam 59 anos)

- ▶ Devem ter pelo menos uma dose da vacina tríplice viral, independente de história pregressa da doença. Caso a pessoa não apresente comprovação de vacina anterior, aplicar uma dose da vacina tríplice viral na visita ao posto de vacinação. As mulheres vacinadas deverão evitar a gravidez por pelo menos um mês após a vacinação

- ▶ O Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde elaborou critérios para pessoas que não estão incluídas na relação acima, mas são consideradas vulneráveis:
- ▶ Profissionais do setor da saúde (médicos, enfermeiros, dentistas e outros);

Para o público acima, é recomendado duas doses da vacina tríplice viral independente da idade.

Atenção

Esta vacina não é recomendada para gestantes, pessoas imunodeprimidas e crianças menores de seis meses.