

Modelo de filipeta – Uso de Oseltamivir 30 mg + 5 mL da suspensão oral extemporânea (dose 75 mg) – versão 2

Orientação de uso de oseltamivir

Tomar **2 cápsulas inteiras** de oseltamivir 30 mg + **1 cápsula diluída (5mL)** de oseltamivir 30 mg conforme orientação abaixo*, ___ vez(es) ao dia, durante ___ dias.

***Modo de preparo da diluição da cápsula** (lavar as mãos com água e sabão antes da preparação):



1) Abrir 1 cápsula de oseltamivir 30 mg em um copo limpo.



2) Com auxílio de uma seringa ou copo dosador, medir 10 mL de água potável ou filtrada e misturar ao copo.



3) Mexer com uma colher limpa por alguns segundos.



4) Com a mesma seringa, aspirar 5 mL do líquido e administrar via oral.

Observação: desprezar a sobra da diluição.

Em caso de dúvida, entrar em contato com a unidade de saúde.

Orientação de uso de oseltamivir

Tomar **2 cápsulas inteiras** de oseltamivir 30 mg + **1 cápsula diluída (5mL)** de oseltamivir 30 mg conforme orientação abaixo*, ___ vez(es) ao dia, durante ___ dias.

***Modo de preparo da diluição da cápsula** (lavar as mãos com água e sabão antes da preparação):



1) Abrir 1 cápsula de oseltamivir 30 mg em um copo limpo.



2) Com auxílio de uma seringa ou copo dosador, medir 10 mL de água potável ou filtrada e misturar ao copo.



3) Mexer com uma colher limpa por alguns segundos.



4) Com a mesma seringa, aspirar 5 mL do líquido e administrar via oral.

Observação: desprezar a sobra da diluição.

Em caso de dúvida, entrar em contato com a unidade de saúde.

Orientação de uso de oseltamivir

Tomar **2 cápsulas inteiras** de oseltamivir 30 mg + **1 cápsula diluída (5mL)** de oseltamivir 30 mg conforme orientação abaixo*, ___ vez(es) ao dia, durante ___ dias.

***Modo de preparo da diluição da cápsula** (lavar as mãos com água e sabão antes da preparação):



1) Abrir 1 cápsula de oseltamivir 30 mg em um copo limpo.



2) Com auxílio de uma seringa ou copo dosador, medir 10 mL de água potável ou filtrada e misturar ao copo.



3) Mexer com uma colher limpa por alguns segundos.



4) Com a mesma seringa, aspirar 5 mL do líquido e administrar via oral.

Observação: desprezar a sobra da diluição.

Em caso de dúvida, entrar em contato com a unidade de saúde.

Orientação de uso de oseltamivir

Tomar **2 cápsulas inteiras** de oseltamivir 30 mg + **1 cápsula diluída (5mL)** de oseltamivir 30 mg conforme orientação abaixo*, ___ vez(es) ao dia, durante ___ dias.

***Modo de preparo da diluição da cápsula** (lavar as mãos com água e sabão antes da preparação):



1) Abrir 1 cápsula de oseltamivir 30 mg em um copo limpo.



2) Com auxílio de uma seringa ou copo dosador, medir 10 mL de água potável ou filtrada e misturar ao copo.



3) Mexer com uma colher limpa por alguns segundos.



4) Com a mesma seringa, aspirar 5 mL do líquido e administrar via oral.

Observação: desprezar a sobra da diluição.

Em caso de dúvida, entrar em contato com a unidade de saúde.