

# CALENDRIER DE VACCINATION

## Enfants de moins de 6 Ans

ATUALIZADO 11.10.2022

AGE	VACCINES
À PARTIR DU NAISSANCE	BCG <sup>1</sup>
	HEPATITE B <sup>2</sup>
2 MOIS	VACCINS VIP <sup>3</sup>
	PENTAVALENT (DTP+Hib+HB)
	ROTAVÍRUS <sup>4</sup>
	PNEUMOCOQUE 10 VAILLANT
3 MOIS	MENINGOCÓCICA C
4 MOIS	VACCINS VIP <sup>3</sup>
	PENTAVALENT (DTP+Hib+HB)
	ROTAVÍRUS <sup>5</sup>
	PNEUMOCOQUE 10 VAILLANT
5 MOIS	MENINGOCÓCICA C
6 MOIS	VACINA VIP <sup>3</sup>
	PENTAVALENTE (DTP+Hib+HB)
9 MOIS	FEBRE AMARELA
12 MOIS	ROUGEOLE-OREILLONS-RUBÉOLE (SCR)
	PNEUMOCOQUE 10 VAILLANT
	MENINGOCÓCICA C
15 MOIS	TETRAVIRAL (SCR+VARICELA) <sup>8</sup>
	VOP <sup>6</sup>
	DTP <sup>7</sup>
	HEPATITE A <sup>11</sup>
4 ANS	VOP <sup>7</sup>
	DTP
	VARICELA (2 <sup>a</sup> dose) <sup>9</sup>
	FIÈVRE JAUNE <sup>12</sup>
ANUELLEMENT	INFLUENCE <sup>11</sup>

- Si le vaccin BCG n'a pas été administré à la maternité, appliquer lors de la première visite au service de santé.
- Le vaccin contre l'hépatite B doit être administré de préférence dans les 12 premières heures de la vie, toujours à la maternité. Si elle n'a pas été administrée à la maternité, appliquer lors de la première visite au service de santé. Si la première visite a lieu après la 6<sup>ème</sup> semaine de vie, administrer le vaccin pentavalent (DTP-Hib-HB).
- Vaccin inactivé contre la polio.
- La 1<sup>ère</sup> dose du vaccin rotavirus doit être administrée à l'âge de 2 mois. L'âge minimum pour l'administration de cette dose est de 1 mois et 15 jours et l'âge maximum est de trois mois et 15 jours.
- La deuxième dose du vaccin rotavirus doit être administrée à l'âge de 4 mois. L'âge minimum pour l'administration de cette dose est de 3 mois et 15 jours et l'âge maximum est de 7 mois et 29 jours.
- Vaccin oral contre la polio.
- Le vaccin DTC (diphtérie, tétanos et coqueluche) ne peut être administré qu'à des enfants de moins de 6 ans, 11 mois et 29 jours. À partir de 7 ans, utiliser le vaccin double adulte.
- Le vaccin tétraviral doit être administré aux enfants qui ont déjà reçu une dose de Rougeole-oreillons-rubéole.
- La 2<sup>ème</sup> dose doit être appliquée de 4 ans à 6 ans, 11 mois et 29 jours.
- Disponible sur le réseau public pendant les périodes de campagne. Enfants à partir de 6 mois.
- Vaccin disponible pour les enfants jusqu'à 4 ans, 11 mois et 29 jours.
- Le vaccin contre la fièvre jaune doit être administré en renfort aux enfants ayant reçu la première dose de vaccin avant l'âge de 5 ans. L'intervalle minimal de 30 jours entre les doses doit être respecté.

**BCG** – Vacina BCG (contra tuberculose)

**VIP** – Vaccin polio 1,2 et 3 (inactivé)

**VOP** – Vaccin polio 1 et 3 (atténué)

**DTP** – Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (tríplice bacteriana)

**Note:** Actuellement, la Secrétaire d'État à la Santé de São Paulo, en raison de la situation épidémiologique, recommande l'application de Dose Zéro (D0) de SCR à 6 mois de vie

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde/CVE/Divisão de Imunização



SAÚDE  
DIREITOS HUMANOS  
E CIDADANIA



# CALENDRIER DE VACCINATION

Pour enfants (plus de 7 ans) et adolescents <sup>1</sup>

ATUALIZADO 27.07.2022

INTERVALO ENTRE AS DOSES	VACCINS	SCHEMA
PREMIÈRE VISITE	BCG <sup>2</sup>	DOSE UNIQUE
	HEPATITE B	PREMIÈRE DOSE
	dT - DOUBLE TYPE ADULTE <sup>3</sup>	PREMIÈRE DOSE
	VIP	PREMIÈRE DOSE
	HPV <sup>4</sup>	PREMIÈRE DOSE
2 MOIS APRÈS PREMIÈRE VISITE	ROUGEOLE, OREILLONS, RUBÉOLE - SCR	PREMIÈRE DOSE
	MENIGOCÓCICA ACWY <sup>5</sup>	DOSE UNIQUE
	HEPATITE B <sup>6</sup>	DEUXIÈME DOSE
	dT - DOUBLE TYPE ADULTE <sup>3</sup>	DEUXIÈME DOSE
	VIP	DEUXIÈME DOSE
4-6 MOIS APRÈS PREMIÈRE VISITE	ROUGEOLE, OREILLONS, RUBÉOLE - SCR	DEUXIÈME DOSE
	HPV <sup>7</sup>	DEUXIÈME DOSE
	HEPATITE B <sup>8</sup>	TROISIEME DOSE
	dT - DOUBLE TYPE ADULTE <sup>3</sup>	TROISIEME DOSE
	VIP	TROISIEME DOSE
TOUS LES 10 ANS POUR TOUTE LA	FIÈVRE JAUNE	DOSE UNIQUE
	dT - DOUBLE TYPE ADULTE <sup>9</sup>	DOSE DE RENFORT

- Adolescence - période entre 10 et 19 ans. Si la personne présente des documents avec un schéma de vaccination incomplet, compléter le schéma initié.
- Le vaccin BCG est indiqué pour les personnes de moins de 15 ans.
- Si l'adolescent a reçu trois doses ou plus des vaccins DTT, DT et dT, appliquer une dose de rappel si 10 ans se sont écoulés depuis la dernière dose.
- Vaccin papillomavirus humain pour les filles de 9 ans à 14 ans, 11 mois et 29 jours. Et les garçons de 11 ans à 14 ans, 11 mois et 29 jours.
- Vaccin méningococcique ACWY de 11 ans à 14 ans, 11 mois et 29 jours.
- L'intervalle minimum entre la première et la deuxième dose du vaccin contre l'hépatite B est de 4 semaines.
- Ou intervalle minimal entre la première dose et la seconde dose de Vacina papilomavirus humain et de 6 mois.
- L'intervalle pour la troisième dose du vaccin contre l'hépatite B peut être de deux mois après la seconde, à condition que l'intervalle de temps écoulé à la première dose soit d'au moins quatre mois.
- Dans la prophylaxie du tétanos après certains types de blessures, on devrait réduire cet intervalle à 5 ans.

BCG - Vaccin BCG (contre la tuberculose)

dT - Vaccin adsorbé diphtérie et tétane adulte (dupla type adulte)

VIP - Vaccin contre la polio 1,2 et 3 (inactivé)

HPV - Vaccin papillomavirus humain 6, 11, 16 e 18 (recombinant)

Source : Département de la santé de l'État/CVE/Division de la vaccination



SAÚDE  
DIREITOS HUMANOS  
E CIDADANIA



CIDADE DE  
SÃO PAULO

# CALENDRIER DE VACCINATION

Pour adultes de 20 à 59 ans<sup>1</sup>

ATUALIZADO 28.04.2022

INTERVALLE	VACCINS	SCHEMA
PREMIERE VISITE	dT <sup>2</sup> - (DIPHTÉRIE ET TÉTANOS)	PREMIÈRE DOSE
	HEPATITE B	PREMIÈRE DOSE
	ROUGEOLE, OREILLONS, RUBÉOLE - SCR	DOSE UNIQUE
2 MOIS APRÉS PREMIÈRE VISITE	dT	DEUXIÈME DOSE
	HEPATITE B <sup>4</sup>	DEUXIÈME DOSE
	FIÈVRE JAUNE <sup>5</sup>	DOSE UNIQUE
4-6 MOIS APRÉS PREMIÈRE VISITE	dT	TROISIEME DOSE
	HEPATITE B <sup>6</sup>	TROISIEME DOSE
TOUS LES 10 ANS POUR TOUTE LA	dT <sup>7</sup>	DOSE DE RENFORT

Source : Département de la santé de l'État/CVE/Division de la vaccination

Remarque : Le vaccin contre le VPH est disponible pour les jeunes de moins de 26 ans vivant avec le VIH/sida, ayant subi une transplantation d'organes solides, une greffe de moelle osseuse ou des patients oncologiques (schéma à 3 doses - 0,2,6 mois).

Vacina dt - vaccin adsorbé diphtérie et tétanos ( dupla type adulte ).

- Si la personne présente des documents avec un schéma de vaccination incomplet, il est sournois de compléter le schéma déjà commencé.
- Si l'adulte a reçu 3 doses ou plus des vaccins DTC, DT, dT, appliquer une dose de rappel si 10 ans se sont écoulés depuis la dernière dose.
- Pour les personnes de 20 à 29 ans et les personnes de santé professionnelle, deux doses du vaccin SCR sont recommandées, à 4 semaines d'intervalle. Les adultes nés à partir de 1960 doivent avoir au moins une dose. Le vaccin est également disponible pour les femmes dans la puerpéralité; si elle n'a pas été administrée dans la puerpéralité, l'administrer lors de la première visite au service de santé.
- L'intervalle minimum entre la première et la deuxième dose du vaccin contre l'hépatite B est de 4 semaines.
- Si la personne n'a reçu qu'une dose du vaccin fièvre jaune avant l'âge de 5 ans, elle doit recevoir une dose supplémentaire, quel que soit l'âge auquel la personne demande le service de vaccination.
- L'intervalle pour la troisième dose du vaccin hépatite B peut être de 2 mois après la deuxième, à condition que l'intervalle de temps écoulé à la première dose soit d'au moins 4 mois.
- Dans la prophylaxie du tétanos, après certains types de blessures, on devrait réduire cet intervalle à 5 ans. En cas de grossesse observer le calendrier spécifique pour la femme enceinte.



SAÚDE  
DIREITOS HUMANOS  
E CIDADANIA



# CALENDRIER DE VACCINATION

Pour 60 ans et plus<sup>1</sup>

ATUALIZADO 28.04.2022

INTERVALLE	VACCINS	SCHEMA
PREMIÈRE VISITE	dT <sup>2</sup>	PREMIÈRE DOSE
	FIÈVRE JAUNE	DOSE UNIQUE
	HEPATITE B	PREMIÈRE DOSE
	ROUGEOLE-OREILLONS-RUBÉOLE (SCR)	DOSE UNIQUE
2 MOIS APRÈS PREMIÈRE VISITE	dT	DEUXIEME DOSE
	HEPATITE B <sup>5</sup>	DEUXIEME DOSE
4-6 MOIS APRÈS PREMIÈRE VISITE	dT	TROISIEME DOSE
	HEPATITE B <sup>6</sup>	TROISIEME DOSE
ANNUELLEMENT	GRIPPE INFLUENZA <sup>7</sup>	
A CHAQUE 10 ANS	dT <sup>8</sup>	DOSE DE RENFORT

Source : Département de la santé de l'État/CVE/Division de la vaccination

Note : Vaccin contre le pneumocoque 23-Valente. Indiquée lors des campagnes nationales de vaccination, pour les personnes âgées de 60 ans et plus et les personnes vivant dans des institutions fermées telles que : maisons gériatriques, hôpitaux, maisons de retraite, maisons de retraite. Administrer une (1) dose supplémentaire, une seule fois, en respectant l'intervalle minimal de cinq (5) ans de la dose initiale, à condition d'avoir commencé le schéma avant l'âge de 65 ans.

Vacina dt - vacina adsorvida diphtérie et tétanos ( dupla type adulte ).

- Si la personne présente des documents avec un schéma de vaccination incomplet, il est sournois de compléter le schéma initié.
- Si l'adulte a reçu 3 doses ou plus des vaccins DTC, DT, dT, appliquer une dose de rappel si 10 ans se sont écoulés depuis la dernière dose.
- Évaluer le risque de vaccination en tenant compte du risque de maladie et d'événements indésirables dans cette tranche d'âge ou de comorbidité.
- Les adultes nés à partir de 1960 doivent recevoir au moins une dose
- L'intervalle minimum entre la première et la deuxième dose du vaccin contre l'hépatite B est de 4 semaines.
- L'intervalle pour la troisième dose du vaccin contre l'hépatite B peut être de deux mois après la seconde, à condition que l'intervalle de temps écoulé à la première dose soit d'au moins quatre mois.
- Disponible sur le réseau public pendant les périodes de campagne.
- Dans la prophylaxie du tétanos, après certains types de blessures, on devrait réduire cet intervalle à 5 ans.



SAÚDE  
DIREITOS HUMANOS  
E CIDADANIA



# SCHÉMA DE VACCINATION

Pour femme enceinte<sup>1</sup> et accouchée

ATUALIZADO 28.04.2022

INTERVALLE	VACCINS	SCHEMA
PREMIÈRE VISITE	dT <sup>2</sup>	PREMIÈRE DOSE
	HEPATITE B	PREMIÈRE DOSE
2 MOIS APRÈS PREMIÈRE VISITE	dT	DEUXIÈME DOSE
	HEPATITE B <sup>3</sup>	DEUXIÈME DOSE
4-6 MOIS APRÈS PREMIÈRE VISITE	dTpa <sup>4</sup>	TROISIEME DOSE
	HEPATITE B <sup>5</sup>	TROISIEME DOSE
À TOUT STADE DE LA GESTATION	GRIPPE INFLUENZA <sup>6</sup>	UNE DOSE
PUERPERALITE	GRIPPE INFLUENZA <sup>7</sup>	UNE DOSE
	ROUGEOLE, OREILLONS, RUBÉOLE - SCR	DOSE UNIQUE

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde/CVE/Divisão de Imunização

Remarque : Le vaccin dTpa est disponible pour les puerperas qui ont manqué l'occasion de la vaccination pendant la grossesse. Il est recommandé de vacciner le plus tôt possible.

Vacina dt - vacina adsorvida diphtérie et tétanos (dupla type adulte).

Vacina dTpa-vacina absorvida diferencial, tétano e pertussis hashular (tri plice rushing do adulto)

- Si la personne présente des documents avec un schéma de vaccination incomplet, il est surnois de compléter le schéma initié.
- Si la femme enceinte ou accouchée a reçu trois doses ou plus des vaccins DTC, DT, dT, appliquer une dose de rappel avec le vaccin dTpa.
- L'intervalle minimum entre la première et la deuxième dose du vaccin contre l'hépatite B est de 4 semaines.
- Disponible sur le réseau public pendant les périodes de campagne.
- Si le vaccin n'a pas été administré pendant la grossesse.
- Pour les pucerons adolescents, adultes jusqu'à 29 ans et professionnels de la santé, deux doses du vaccin SCR sont recommandées, avec un intervalle d'au moins 4 semaines. Les femmes de plus de 29 ans doivent avoir au moins une dose.
- Si le vaccin n'a pas été administré pendant la grossesse.
- Pour les pucerons adolescents, adultes jusqu'à 29 ans et professionnels de la santé, deux doses du vaccin SCR sont recommandées, avec un intervalle d'au moins 4 semaines. Les femmes de plus de 29 ans doivent avoir au moins une dose.



SAÚDE  
DIREITOS HUMANOS  
E CIDADANIA

