



De **Olho** na carteirinha

**Calendário da Vacina Meningocócica
ACWY e HPV no MSP**

- Público elegível

-Ampliação de faixa etária

Ampliação da Vacinação Meningocócica ACWY e HPV no município de São Paulo



O Programa Municipal de Imunizações (PMI) da Cidade de São Paulo, vem através deste, atualizar o quadro dos grupos elegíveis para receber a vacina Meningocócica ACWY (Conjugada) e a vacina contra HPV, em conformidade com o Comunicado do Ministério da Saúde e do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo que dispõe sobre a *Ampliação da oferta da vacina Meningocócica ACWY (Conjugada) para adolescentes não vacinados entre 11 e 14 anos de idade (de forma temporária) e ampliação da oferta da vacina HPV para meninos de 09 a 14 anos de idade.*

Quadro 1. Elegibilidade para receber imunização Meningocócica ACWY (Conjugada)

Meningocócica ACWY (Conjugada)			
Grupos	Antes da ampliação	Após a ampliação	Doses
Meninas	De 11 anos até 12 anos, 11 meses e 29 dias de idade.	De 11 anos até 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade.	Dose Única
Meninos	De 11 anos a 12 anos, 11 meses e 29 dias de idade.	De 11 anos a 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade.	

***Ampliação temporária até junho 2023**

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde/CVE/Divisão de Imunização

**** A vacina Meningocócica ACWY (conjugada) pode ser realizada para aqueles que têm comprovação de dose anterior, desde que vacinados com idade abaixo de 11 anos (10 anos, 11 meses e 29 dias) e com intervalo mínimo de 4 semanas entre as doses. Para crianças e adolescentes com comprovação de dose realizada acima de 11 anos de idade com a vacina Meningocócica ACWY, considerar esquema encerrado.**

Ampliação da Vacinação Meningocócica ACWY e HPV no município de São Paulo



Quadro 2. Elegibilidade para receber imunização contra a HPV

Vacina papilomavirus humano - HPV			
Grupos	Antes da ampliação	Após a ampliação	Doses
Meninas	De 9 anos até 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade.	De 9 anos até 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade.	O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose da vacina HPV é de 6 meses.
Meninos	De 11 anos a 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade.	De 9 anos até 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade.	
Mulheres	Imunossuprimidas* até 45 anos de idade.	Imunossuprimidas* até 45 anos de idade.	O intervalo mínimo entre a primeira dose e as demais são: -2º dose: após 2 meses -3º dose: após 6 meses
Homens	Imunossuprimidos* até 45 anos de idade.	Imunossuprimidos* até 45 anos de idade.	

***Pessoas imunossuprimidas:** pessoas vivendo com HIV/AIDS, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea e pacientes oncológicos.

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde/CVE/Divisão de Imunização

Certos de que essas ampliações de faixa etária é uma medida importante para garantir a proteção nessa fase de vida, os novos grupos elegíveis poderão receber a vacina ACWY e HPV a partir desta data, em todas as 470 unidades básicas de saúde, 17 Serviços de Atenção Especializada e 3 Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais.

São Paulo, 20 de outubro de 2022
Programa Municipal de Imunizações-PMI
Coordenadoria de Vigilância em Saúde-COVISA
Secretaria Municipal de Saúde -São Paulo-SMS