



Secretaria Municipal da Saúde

**Nota Técnica nº 005/2020:  
CONDIÇÕES CLÍNICAS QUE INDICAM A  
NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO PARA  
PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO**

13/Agosto/2020

## Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para Pré-Natal de Alto Risco

### Hipertensão em Gestantes

- hipertensão crônica (previamente hipertensa ou diagnosticada antes da 20ª semana gestacional): **(CID10: O10,9)**
- hipertensão gestacional: **(CID10: O14.9)**
  - diagnosticada após 20ª semana (após excluída suspeita de pré-eclâmpsia); ou
  - diagnóstico de pré-eclâmpsia (após estratificação de gravidade em serviço de emergência obstétrica); ou
  - em gestação prévia com mau resultado obstétrico e/ou perinatal (interrupção prematura da gestação, morte fetal intrauterina, síndrome HELLP, eclâmpsia, parada cardiorrespiratório ou internação em CTI durante a gestação).

### Diabetes em Gestantes

- diagnóstico de diabetes mellitus antes da gestação **(CID: O24.3)**
- diabetes gestacional e: **(CID: O24.9)**
  - ausência de controle glicêmico com medidas não farmacológicas
  - gestante com hipertensão crônica.

### Anemias em Gestantes **(CID: O99.0)**

- gestante com diagnóstico de anemia falciforme ou outras hemoglobinopatias; ou
- hemoglobina < 8 g/dl sem sinais ou sintomas de gravidade; ou
- hemoglobina entre 8 g/dl e 11 g/dl sem melhora após tratamento otimizado (sulfato ferroso 200 mg de ferro elementar por 60 dias); ou
- hemoglobina < 10 g/dl em pacientes com cirurgia bariátrica prévia.

### Hipotireoidismo **(CID: E03.9)** e Hipertireoidismo **(CID: E0.5)** em Gestantes

- suspeita de hipotireoidismo **central (TSH normal ou baixo e T4 livre ou total baixo)**; ou
- paciente com hipotireoidismo usando mais de 2,5 mcg/kg de levotiroxina.
- diagnóstico de hipertireoidismo.

### Gestação com abortamento recorrente **(CID: N96)**

- Gestante com história de abortamento recorrente:
  - perda espontânea e consecutiva de três ou mais gestações antes das 20ª semana em mulheres com idade < 35 anos; ou
  - perda espontânea e consecutiva de duas ou mais gestações antes das 20ª semana em mulheres com idade > 35 anos;
  - presença de comorbidades que aumentam o risco de abortamento espontâneo, como suspeita clínica de síndrome antifosfolípideo (ver quadro 2 no anexo); ou
  - história prévia de incompetência istmo-cervical (dilatação cervical indolor no segundo trimestre seguida de expulsão de feto imaturo); ou
  - suspeita atual de incompetência istmo-cervical (comprimento cervical, determinado por ecografia, inferior a 2,5 cm em mulher com história de parto prematuro prévio ou menor que 2,0 cm em mulher sem história de parto prematuro prévio).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**Hepatite B e C em Gestantes (CID: O98.4)**

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para **Alto Risco** e para Serviço de

**Hepatites virais ou Infectologia:**

- hepatite viral aguda por vírus C ou
- hepatite viral crônica por vírus C; ou
- hepatite viral crônica por vírus B.

**Toxoplasmose em Gestantes (O98.6)**

- suspeita ou diagnóstico de toxoplasmose aguda gestacional

**Isoimunização Rh (CID10: O36.0)**

- gestante com diagnóstico de isoimunização Rh em gestação anterior; ou
- gestante com Rh negativo e Coombs indireto positivo, em qualquer título; ou
- gestante com Rh negativo com feto apresentando achados ecográficos de anemia;

**Outras condições clínicas maternas**

- infarto do miocárdio prévio; ou cardiopatias graves; **(CID10: O99.4)**; ou
- pneumopatias graves **(CID10: O99.5)**; ou
- nefropatias graves (como doença renal crônica, glomerulonefrite)**(CID10: O26.8)**; ou
- doenças hematológicas (como trombofilias, anemia falciforme, púrpura trombocitopênica idiopática) **(CID10: O99.1)**; ou
- doenças neurológicas (como epilepsia, acidente vascular prévio, paraplegia/tetraplegia) **(CID10: O99.3)**; ou
- doenças autoimunes (lúpus eritematoso sistêmico, síndrome antifosfolípideo, outras colagenoses) **(CID10: O99.1)**; ou
- deformidade esquelética materna grave **(CID10: O99.8)**; ou
- desnutrição ou obesidade mórbida;**(CID10:O99.2)** ou
- diagnóstico de neoplasia maligna atual (com exceção de neoplasia de pele não melanoma)**(CID10: C80)**; ou
- suspeita de câncer de mama **(CID10:C50.9)** ou ginecológico (tumor anexial **(CID10: C56** ou **C57.0)** displasia de alto grau) **(CID10: N87.2)**; ou
- tromboembolismo venoso prévio **(CID10: O22.3)**
- doenças psiquiátricas graves que necessitam de acompanhamento com especialista focal em psiquiatria: (como psicose, depressão grave ou transtorno de humor bipolar)**(CID10: O99.3)**.

**Grupos especiais:**

- Adolescentes com 14 anos ou menos**(CID10: Z35.6)**;
- Adolescentes em qualquer idade com comorbidade associada (caso não apresentem comorbidades, deverão ser acompanhados nas UBS); - **usar o CID da comorbidade**;
- Gestantes com mais de 40 anos com comorbidade associada (caso não apresentem comorbidades, deverão ser acompanhados nas UBS). **usar o CID da comorbidade**.

**Condições fetais**

- gemelaridade **(CID10: O30)**; ou
- suspeita de crescimento intrauterino restrito **(CID10: PO5.9)** por altura uterina, quando não houver ecografia disponível.

**Alterações ecográficas na Gestação**

- **Alterações no Líquido Amniótico (CID10: O41.9):**

- oligodrâmnio (ILA menor que 8 cm associado a crescimento intrauterino restrito ou bolsão < 2 cm); ou
  - polidrâmnio consequente à anomalia fetal;
  - polidrâmnio grave (ILA maior que 35 cm ou bolsão > 16 cm) ou sintomático (dor, dispneia) se necessário após avaliação em serviço de emergência obstétrica.
- **Alterações Placentárias(CID10: O43.9):**
    - placenta prévia oclusiva total, independente da idade gestacional; ou
    - placenta prévia oclusiva parcial em ecografia realizada em gestante com mais de 28 semanas de gestação; ou
    - acretismo placentário ou situação de alto risco para essa condição (implantação placentária anterior sobre a cicatriz de cesariana prévia); ou
    - inserção velamentosa do cordão.
  - **Alterações fetais:**
    - crescimento intrauterino restrito (feto abaixo do percentil 10 para idade gestacional) **(CID10: PO5.9)**;
    - fetos com malformações maiores ou sugestivas de síndrome genética **(CID10: Q89.9)**; (apresentam consequências clínicas/funcionais ou sociais, como: fenda labial ou palatina, sindactilia, microcefalia, hipoplasia ou ausência de membro, meningomielocelo/espinha bífida, higroma cístico, onfalocele, gastrosquise, cardiopatia, anencefalia, etc.).
- Mau passado Obstétrico(CID10: Z35.2):**
- **Condições fetais**
    - história de óbito fetal nos 2º e 3º trimestre.
    - Prematuridade
  - **Condições maternas**
    - Eclampsia,
    - Síndrome HELLP,
    - parada cardiorrespiratória ou internação em CTI durante a gestação
    - acretismo placentário em gestação anterior;
    - cesariana prévia com incisão uterina longitudinal.