

**Nota Informativa 07
PMCT /2023**

Dose Plena para Tratamento da Tuberculose

30 de janeiro de 2023

2023

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde
Secretaria Executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância em Saúde
Coordenadoria de Vigilância em Saúde
Divisão de Vigilância Epidemiológica



**CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE**

MEDICAMENTO RIFAMPICINA 300MG + ISONIAZIDA 150MG (2x1 DOSE PLENA) COMPRIMIDO PARA TRATAMENTO DA TUBERCULOSE

Considerando o Ofício nº 104/2021/CGDR/DCCI/SVS/MS de 16 de abril de 2021, referente “Informações sobre a disponibilidade do medicamento Rifampicina 300mg + Isoniazida 150mg (2x1 dose plena), comprimido, para tratamento da Tuberculose (TB)”, e o Comunicado TB 16/2022 de 13 de dezembro de 2022 emitido pelo CVE, que reforça a recomendação do uso da dose plena na fase de manutenção (2ª fase) do tratamento da TB, apresentamos os quadros 1 e 2 com as orientações quanto as doses a serem prescritas de acordo com a faixa de peso do usuário.

Quadro 1. Esquema Básico de tratamento da Tuberculose em adultos e adolescentes (≥10 anos de idade)

Esquema e duração	Faixas de peso	Dose
2 meses RHZE* (Fase de ataque)	20 kg a 35 kg	2 comprimidos
	36 kg a 50 kg	3 comprimidos
	51 kg a 70 kg	4 comprimidos
	>70 kg	5 comprimidos
4 meses RH* (Fase de manutenção)	20 kg a 35 kg	1 comprimido de 300/150 mg
	36 kg a 50 kg	1 comprimido de 300/150 mg + 1 comprimido de 150/75 mg
	51 kg a 70 kg	2 comprimido de 300/150 mg
	>70 kg	2 comprimido de 300/150 mg + 1 comprimido de 150/75 mg

***R = rifampicina, H = isoniazida, Z = pirazinamida, E = etambutol**

Fonte: Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil (Brasil, 2019)

Quadro 2. Esquema Básico para o tratamento da TB meningoencefálica e osteoarticular em adultos e adolescentes (≥10 anos de idade)

Esquema e duração	Faixas de peso	Dose
2 meses RHZE* (Fase de ataque)	20 kg a 35 kg	2 comprimidos
	36 kg a 50 kg	3 comprimidos
	51 kg a 70 kg	4 comprimidos
	>70 kg	5 comprimidos
10 meses RH* (Fase de manutenção)	20 kg a 35 kg	1 comprimido de 300/150 mg
	36 kg a 50 kg	1 comprimido de 300/150 mg + 1 comprimido de 150/75 mg
	51 kg a 70 kg	2 comprimido de 300/150 mg
	>70 kg	2 comprimido de 300/150 mg + 1 comprimido de 150/75 mg

*R = rifampicina, H = isoniazida, Z = pirazinamida, E = etambutol

Fonte: Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil (Brasil, 2019)

A apresentação Rifampicina 300mg + Isoniazida 150mg (2x1 dose plena) deverá ser prescrita para todos os casos, na segunda fase de tratamento de tuberculose.

Solicitamos atenção especial dos profissionais de saúde para que a dispensação do medicamento seja adequada, bem como a orientação aos usuários. O uso incorreto desta apresentação pode levar a eventos adversos muitas vezes graves como hepatotoxicidade, devendo a equipe de saúde e o paciente estarem bem orientados sobre qual medicamento esta recebendo e como fazer uso deste.

Antes do início e durante todo o tratamento de Tuberculose, a cada atendimento na unidade de saúde, o usuário deverá ser orientado pela equipe da unidade de saúde (médicos, farmacêuticos e enfermeiros) sobre a posologia e uso correto do medicamento.

A bula do medicamento Rifampicina 300mg + Isoniazida 150mg (2x1 dose plena) está disponível no Bulário Eletrônico da Anvisa:

[https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=Farman guinhos%20Isoniazida%2BRifampicina](https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=Farman%20Isoniazida%2BRifampicina)

REFERÊNCIAS

Brasil. Ministério da Saúde. Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil. Ministério da Saúde, Brasília, 2019.

Brasil. Ministério da Saúde. Ofício N° 104/2021/CGDR/DCCI/SVS/MS de 16 de abril de 2021. Informações sobre a disponibilidade do medicamento Rifampicina 300mg + Isoniazida 150mg (2x1 dose plena), comprimido, para tratamento da Tuberculose (TB). Brasília, 2021.

**ESQUEMA BÁSICO DE TRATAMENTO DE TUBERCULOSE PULMONAR
PARA ADULTOS E ADOLESCENTE ≥10 ANOS**

Esquema e duração	Faixas de peso	Dose
2 meses RHZE (Fase de ataque Fase 1)	20 kg a 35 kg	2 comprimidos
	36 kg a 50 kg	3 comprimidos
	51 kg a 70 kg	4 comprimidos
	> 70 kg	5 comprimidos
4 meses RH (Fase de manutenção Fase 2)	20 kg a 35 kg	1 comp de 300/150 mg
	36 kg a 50 kg	1 comp de 300/150 mg + 1 comp de 150/75 mg
	51 kg a 70 kg	2 comp de 300/150 mg
	> 70 kg	2 comp de 300/150 mg + 1 comp de 150/75 mg

Esquema e duração	Faixas de peso	Dose	
		300/150mg	150/75mg
4 meses RH (Fase de manutenção- Fase 2)	20 kg a 35 kg		
	36 kg a 50 kg		
	51 kg a 70 kg		
	> 70 kg		



COMPARAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES

4X1 RIPE
RIFAMPICINA/ISONIAZIDA/
PIRAZINAMIDA/ETAMBUTOL
150/75/400/275 MG



DOSE PLENA 2X1
RIFAMPICINA/ISONIAZIDA
300/150 MG



MEIA DOSE 2x1
RIFAMPICINA/ISONIAZIDA
150/75 MG

