

NOTA INFORMATIVA CONJUNTA Nº 001/2022/COORDENADORIA IST/AIDS E ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - SMS-SP.

Dispõe sobre as definições do uso de Ceftriaxona 500mg para tratamento de corrimento uretral masculino, cervicite e doença inflamatória pélvica (DIP) leve.

Atualização da recomendação nacional do tratamento preferencial da infecção gonocócica anogenital não complicada (uretra, colo do útero e reto).

I – INTRODUÇÃO

No ano de 2016, o Ministério da Saúde realizou estudo de vigilância da resistência *in vitro* do gonococo (Rede de Monitoramento da Resistência Antimicrobiana do Gonococo) em que participaram de 7 (sete) sítios em diferentes localidades no país, incluindo São Paulo.

Além das resistências já bem estabelecidas às sulfas, tetraciclina e penicilinas, constatou-se **resistência** emergente e em expansão ao **Ciprofloxacino**, com taxas superiores a 50% em todas as regiões do país.

II - INFORMAÇÕES

Diante do exposto, e considerando a portaria número - 1.897, de 26 de Julho de 2017, que estabelece a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Renome 2017, foi incluída a ceftriaxona, como esquema terapêutico preferencial, preconizado para a infecção gonocócica anogenital não complicada (uretra, colo do útero e reto) em todo o país, **passa a ser constituído pela terapia dupla de Ceftriaxona 500mg intramuscular (IM) em dose única, associada à Azitromicina 1g (VO) em dose única**, conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Infecções Sexualmente Transmissíveis (PCDT-IST), 2020, do Ministério da Saúde, Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-atencao-integral-pessoas-com-infeccoes>.

III - RECOMENDAÇÕES

Diante disso, foi recomendado aos estados e municípios a aquisição da **Ceftriaxona 500mg, (IM)** em substituição ao **Ciprofloxacino 500mg (VO)** e sua disponibilização aos serviços de saúde, para o tratamento da gonorreia.


O uso diferente do recomendado nessa nota acarretará em tratamento inadequado da gonorreia, aumentando os riscos da resistência aos antimicrobianos e consequentes **danos à saúde da população devido suas complicações**, além de não interromper a cadeia de transmissão.

Informamos que a PMSP dispõe de **Ceftriaxona 500mg** para uso IM e estará disponível na rede municipal especializada em IST/AIDS (SAE e CR), Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Urgência e Emergência da rede pública municipal, conforme necessidades dos serviços. Portanto, casos de corrimento uretral masculino e cervicite deverão ter prescrição de **Ceftriaxona 500mg, IM, dose única + Azitromicina 1g, VO, em dose única**. Casos suspeitos de DIP leve (Fluxograma para Desconforto e dor pélvica) deverão seguir recomendação segundo PCDT-IST.

Atenciosamente,



Robinson Fernandes de Camargo
Coordenador da Assistência da Coord. IST/Aids



Felipe Tadeu Carvalho Santos
Divisão de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos/CAB/SEABVS/SMS