



# De Olho na carteirinha

**Vacinação Pneumocócica em  
maiores de 60 anos institucionalizados e  
acamados**

## 1- INTRODUÇÃO

O *Streptococcus pneumoniae* ou **pneumococo** é uma bactéria gram-positiva, capsulada, que tem mais de 90 sorotipos imunologicamente distintos de importância epidemiológica mundial na distribuição das doenças pneumocócicas invasivas (pneumonias bacteriêmicas, meningite, sepse e artrite) e não-invasivas (sinusite, otite média aguda, conjuntivite, bronquite e pneumonia).

A vacina pneumocócica conjugada 13 (VPC13) é responsável pela prevenção de 13 sorotipos importantes que acometem principalmente crianças, idosos e população com comorbidades que aumentam a vulnerabilidade para a infecção pneumocócica.

Em informe de vigilância das pneumonias e meningites bacterianas realizado pelo Instituto Adolfo Lutz – SES, observou-se aumento desses 13 sorotipos e em especial os sorotipos 19A e 3 que estão contemplados na vacina conjugada.

As vacinas conjugadas reduzem as taxas de colonização por pneumococo em nasofaringe e, conseqüentemente, a transmissão dessas bactérias na comunidade, tendo relevante papel na imunidade coletiva.


## 2- ESQUEMA DE VACINAÇÃO

O Município de São Paulo (MSP) iniciará em 08/05/2023 a aplicação da VPC13 e VPC23 em pessoas acima de 60 anos institucionalizadas e acamadas, de acordo com esquema de vacinação abaixo.

## Esquema de vacinação:



Para aqueles que já iniciaram o esquema com **VPP23**, recomenda-se o **intervalo de 1 ano** para aplicação da **VPC13**.



Legenda: VPC13, vacina pneumocócica conjugada 13-valente; VPP23, vacina pneumocócica polissacarídica 23-valente.

- Iniciar com uma dose de VPC 13 seguida de uma dose de VPP23 com intervalo de 2 meses, e uma segunda dose de VPP23 cinco anos após a primeira.
- Para aqueles que já receberam uma dose de VPP23, recomenda-se o intervalo de um ano para a aplicação de VPC13. A segunda dose de VPP23 deve ser feita cinco anos após a primeira de VPP23, mantendo intervalo mínimo de 2 meses com a VPC13.
- Para os que já receberam duas doses de VPP23, recomenda-se uma dose de VPC13, com intervalo mínimo de um ano após a última dose de VPP23.
- Acima de 65 anos, não realizar doses adicionais de VPP23. Somente realizar a VPC13 caso o idoso nunca tenha recebido a mesma.

## 3 - REGISTRO DE VACINAÇÃO

### Registro no sistema SIGA

As doses deverão ser registradas nominalmente como estratégia "Especial", Dose "Única":

## Dados do Paciente

 \* Paciente \* Paciente não identificado

## Atendimento Vacinas

\* Registro de Vacinação Anterior

sim  não 

Estabelecimento de Saúde:

\* Profissional que aplica a vacina

\* Vínculo

Código de Equipe

## Vacinação

\* Estratégia de Vacinação

Especial

\* Vacina

PNEUMOCÓCICA 13V

\* Tipo Dose

Dose Não Válida  Dose Válida 

\* Dose

---

\* Lote

---

Fornecedor

Validade

\* Data e Hora da Aplicação

26/04/2023

13:22

Estratégia

Vacina

Tipo Dose

Dose

## Aprazamento

\* Data de Retorno

\* Vacina

---

Programa Municipal de Imunizações - PMI  
 Divisão de Vigilância Epidemiológica - DVE  
 Coordenadoria de Vigilância em Saúde – COVISA  
 Secretaria Municipal da Saúde – SMS