



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

Secretaria Municipal da Saúde
**Autorização para dispensação de alendronato de sódio
para Doença de Paget de ossos**



Nome do usuário: _____

CNS _ _ _ _ _ () Masc. () Fem.

É INDISPENSÁVEL INFORMAR TODOS OS DADOS SOLICITADOS

() INÍCIO DE TRATAMENTO () CONTINUIDADE DE TRATAMENTO

O (a) paciente tem diagnóstico confirmado de Doença de Paget de ossos, de acordo com a descrição no verso deste formulário?

() sim () não

Condição clínica do paciente:

() Pacientes sintomáticos: dor óssea ou articular, fraturas, deformidades ósseas, cefaléia por acometimento dos ossos do crânio, complicações neurológicas; ou

Pacientes assintomáticos com lesões ósseas consideradas de risco para o surgimento de complicações situadas em:

() base do crânio: risco de perda auditiva ou outras complicações neurológicas

() vértebras: risco de complicações neurológicas

() ossos longos: risco de fraturas, deformidades e osteoartrose

() pacientes candidatos à cirurgia ortopédica eletiva no osso afetado

() pacientes com hipercalcemia

Nome legível do médico solicitante

CRM: _____

Assinatura e carimbo

Atendimento da farmácia:

Autorizado: () sim, senha de autorização: _____

() não, motivo _____

Funcionário: _____

Diagnóstico

1. Clínico: pacientes com dor, incluindo dor óssea; deformidades ósseas (inclinação de ossos longos, deformidades cranianas, alargamento de segmentos envolvidos); fraturas (completas ou fissuras do córtex); complicações neurológicas (surdez, paralisia de outros nervos cranianos, compressão da medula espinhal); tumor de transformação (sarcoma).
2. De laboratório clínico: pode haver alteração em marcadores do metabolismo ósseo.
 - Fosfatase alcalina sérica aumentada
 - Hidroxiprolina urinária aumentada
3. Quadros radiográficos da doença de Paget óssea
 - Forma inicial (principalmente lítica): fissuras em V do córtex de ossos longos; osteoporose circunscrita do crânio
 - Fase média (lítica e esclerótica): espessamento do córtex; falta de distinção do limite córtico-medular; acentuação do padrão trabecular
 - Estádio tardio (lesões escleróticas em maioria): espessamento dos ossos longos; secção óssea aumentada; esclerose

Tratamento

Alendronato: 40 mg via oral, dose única diária, por 6 meses.

Bibliografia

Falchetti A et al. Paget's disease of bone: there's more than the affected skeletal - a clinical review and suggestions for the clinical practice. *Current Opinion in Rheumatology* 2010; 22:410-423.

Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas. Doença de Paget dos ossos. Bisfosfonados e Calcitonina. Disponível em:

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/pcdt_doenca_paget_ossos.pdf

Whyte MP. Paget's disease of bone. *N Engl J Med*. 2006 August 10; 355(6): 593-600.