

HANSENÍASE



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DOS CASOS NOTIFICADOS

A Secretaria Municipal da Saúde, desenvolve um conjunto de ações de vigilância que visam o controle e eliminação da doença, de acordo com os princípios do SUS, fortalecendo a vigilância epidemiológica, a promoção à saúde, a educação continuada e a assistência integral aos doentes.

Todas as unidades básicas de saúde do município devem realizar a consulta dirigida a suspensão da doença e quando for um caso suspeito, o mesmo deverá ser encaminhado a uma unidade de referência de hanseníase (UR), para a confirmação diagnóstica, tratamento, acompanhamento e exame de seus contatos intradomiciliares.

A vigilância epidemiológica visa a produção e a divulgação das informações que subsidiam a análise e avaliação das ações de controle da hanseníase.

O município de São Paulo, desde o ano 2.000, alcançou o objetivo da Organização Mundial da Saúde de reduzir a prevalência para menos de 1 caso por 10.000 habitantes. Desde então, a detecção de casos novos vem diminuindo, o que reflete um trabalho sincronizado entre vigilância, educação em saúde e assistência.

Utilizando como uma das estratégias de ação a Campanha Anual, realizada no mês de janeiro (Janeiro Roxo), a divulgação de sinais e sintomas na coletividade, o treinamento dos profissionais da rede pública e o apoio da mídia, favorecem a detecção de casos novos e permite ao município permanecer em constante vigilância.

**Nº de Casos de Hanseníase em Registro Ativo e Coeficiente de Prevalência*
Município de São Paulo - Série Histórica de 2008 a 2018**

Ano de Avaliação	Registro Ativo	Coeficiente de Prevalência
2008	489	0,45
2009	419	0,38
2010	323	0,29
2011	299	0,26
2012	289	0,25
2013	260	0,23
2014	216	0,19
2015	229	0,20
2016	177	0,15
2017	164	0,14
2018	188	0,16


* Prevalência por 10.000 habitantes. Dados atualizados em Julho de 2019

Nº de Casos novos de Hanseníase e Coeficiente de Detecção* Geral e em < 15 anos por ano de diagnóstico no Município de São Paulo - Série Histórica de 2008 a 2018

Ano de diagnóstico	Nº de casos em < 15 anos	Coef Detecção < 15 anos*	Total de casos novos	Coef detecção Geral
2008	15	0,60	246	2,20
2009	24	0,91	239	2,17
2010	24	0,90	242	2,19
2011	10	0,42	231	2,04
2012	8	0,34	216	1,91
2013	3	0,13	176	1,54
2014	6	0,30	155	1,30
2015	3	0,10	168	1,50
2016	2	0,10	128	1,10
2017	4	0,09	115	0,98
2018	1	0,04	128	1,09

* Detecção por 100.000 habitantes. Dados atualizados em Julho de 2019

Casos Diagnosticados, Casos em Registro Ativo, Coeficiente de Detecção e Coeficiente de Prevalência no Município de São Paulo - Série Histórica de 1990 a 2018



* Prevalência por 10.000 habitantes

* Detecção por 100.000 habitantes

Dados atualizados em Julho de 2019