

IDADE	VACINAS
A PARTIR DO NASCIMENTO	BCG ¹
	HEPATITE B ²
2 MESES	VACINA VIP ³
	PENTAVALENTE (DTP+Hib+HB)
	ROTAVÍRUS ⁴
	PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE
3 MESES	MENINGOCÓCICA C
4 MESES	VACINA VIP ³
	PENTAVALENTE (DTP+Hib+HB)
	ROTAVÍRUS ⁵
	PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE
5 MESES	MENINGOCÓCICA C
6 MESES	VACINA VIP ³
	PENTAVALENTE (DTP+Hib+HB)
9 MESES	FEBRE AMARELA
12 MESES	SARAMPO-CAXUMBA-RUBÉOLA (SCR)
	PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE
	MENINGOCÓCICA C
15 MESES	TETRAVIRAL (SCR+VARICELA) ⁸
	VOP ⁶
	DTP ⁷
	HEPATITE A ¹¹
4 ANOS	VOP ⁷
	DTP
	VARICELA (2ª dose) ⁹
	FEBRE AMARELA ¹²
ANUALMENTE	INFLUENZA ¹⁰

01. Caso a vacina BCG não tenha sido administrada na maternidade, aplicar na primeira visita ao serviço de saúde.
02. A vacina hepatite B deve ser administrada preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida, ainda na maternidade. Caso não tenha sido administrada na maternidade, aplicar na primeira visita ao serviço de saúde. Se a primeira visita ocorrer após a 6ª semana de vida, administrar a vacina pentavalente (DTP-Hib-HB).
03. Vacina inativada poliomielite.
04. A 1ª dose da vacina rotavírus deve ser aplicada aos 2 meses de idade. A idade mínima para administração desta dose é de 1 mês e 15 dias e a idade máxima é de três meses e 15 dias.
05. A 2ª dose da vacina rotavírus deve ser aplicada aos 4 meses de idade. A idade mínima para administração desta dose é de 3 meses e 15 dias e a idade máxima é de 7 meses e 29 dias.
06. Vacina oral poliomielite.
07. A vacina DTP(difteria,tétano e coqueluche) só pode ser administrada em crianças até 6 anos, 11 meses e 29 dias. A partir dos 7 anos de idade, utilizar a vacina dupla adulto.
08. A vacina tetraviral deverá ser administrada em crianças que já receberam uma dose de Sarampo-caxumba-rubéola.
09. A 2ª dose deve ser aplicada de 4 anos a 6 anos, 11 meses e 29 dias.
10. Disponível na rede pública durante os períodos de campanha. Crianças a partir de 6 meses.
11. Vacina disponível para crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias.
12. A vacina febre amarela deve ser aplicada como reforço para aquelas crianças que receberam a primeira dose de vacina antes de 5 anos de idade. Deve-se respeitar o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.

BCG – Vacina BCG (contra tuberculose)

VIP – Vacina poliomielite 1,2 e 3 (inativada)

VOP – Vacina poliomielite 1,2 e 3 (atenuada)

DTP – vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (tríplice bacteriana)