

# Nota Informativa 07 DVE/PMCT/2021

## **MEDICAMENTO** **RIFAMPICINA 300MG + ISONIAZIDA 150MG** **(2x1 DOSE PLENA) COMPRIMIDO,** **PARA TRATAMENTO DA TUBERCULOSE**

Atualizada em: 14 de maio de 2021

Prefeitura do Município de São Paulo  
Secretaria Municipal da Saúde  
Coordenadoria de Vigilância em Saúde - COVISA  
Divisão de Vigilância Epidemiológica

# 2021



**CIDADE DE**  
**SÃO PAULO**  
**SAÚDE**

**Nota Informativa PMCT: 07/2021**

São Paulo, 14 de maio de 2021

**MEDICAMENTO RIFAMPICINA 300MG + ISONIAZIDA 150MG (2x1 DOSE PLENA)  
COMPRIMIDO, PARA TRATAMENTO DA TUBERCULOSE**

O medicamento Rifampicina 300mg + Isoniazida 150mg, RH 300/150mg (2x1 dose plena), comprimido foi incorporado no Sistema Único de Saúde por meio da Portaria nº30 de 28 de agosto de 2018, e passará a ser distribuído no SUS em 2021. Com esta nova apresentação do medicamento, haverá uma redução do número de comprimidos administrados diariamente esperando assim, uma maior adesão ao tratamento pelos pacientes.

Considerando o Ofício nº 104/2021/CGDR/DCCI/SVS/MS de 16 de abril de 2021, referente “Informações sobre a disponibilidade do medicamento Rifampicina 300mg + Isoniazida 150mg (2x1 dose plena), comprimido, para tratamento da Tuberculose (TB)”, e o “Comunicado TB nº 12/2021” de 26 de abril de 2021 emitido pelo CVE-SP, apresentamos os quadros 1 e 2 com as orientações quanto as doses a serem prescritas de acordo com a faixa de peso do paciente.

Quadro 1. Esquema Básico de tratamento da Tuberculose em adultos e adolescentes (≥10 anos de idade)

| Esquema e duração                  | Faixas de peso | Dose   |
|------------------------------------|----------------|--|
| 2 meses RHZE<br>(Fase de ataque)   | 20 kg a 35 kg  | 2 comprimidos  |
|                                    | 36 kg a 50 kg  | 3 comprimidos  |
|                                    | 51 kg a 70 kg  | 4 comprimidos  |
|                                    | >70 kg         | 5 comprimidos  |
| 4 meses RH<br>(Fase de manutenção) | 20 kg a 35 kg  | 1 comprimido de 300/150 mg                             |
|                                    | 36 kg a 50 kg  | 1 comprimido de 300/150 mg + 1 comprimido de 150/75 mg |
|                                    | 51 kg a 70 kg  | 2 comprimido de 300/150 mg                             |
|                                    | >70 kg         | 2 comprimido de 300/150 mg + 1 comprimido de 150/75 mg |

Fonte: Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil (Brasil, 2019,2 ed)



Quadro 2. Esquema Básico para o tratamento da TB meningoencefálica e osteoarticular em adultos e adolescentes (≥10 anos de idade)

| Esquema e duração                   | Faixas de peso | Dose   |
|-------------------------------------|----------------|--|
| 2 meses RHZE<br>(Fase de ataque)    | 20 kg a 35 kg  | 2 comprimidos  |
|                                     | 36 kg a 50 kg  | 3 comprimidos  |
|                                     | 51 kg a 70 kg  | 4 comprimidos  |
|                                     | >70 kg         | 5 comprimidos  |
| 10 meses RH<br>(Fase de manutenção) | 20 kg a 35 kg  | 1 comprimido de 300/150 mg                             |
|                                     | 36 kg a 50 kg  | 1 comprimido de 300/150 mg + 1 comprimido de 150/75 mg |
|                                     | 51 kg a 70 kg  | 2 comprimido de 300/150 mg                             |
|                                     | >70 kg         | 2 comprimido de 300/150 mg + 1 comprimido de 150/75 mg |

Fonte: Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil (Brasil, 2019, 2 ed)

Inicialmente, o medicamento Rifampicina 300mg + Isoniazida 150mg (2x1 dose plena) será prescrito para todos os casos com novo início de tratamento e os que irão mudar para a fase de manutenção.

Solicitamos atenção especial aos profissionais de saúde para que a dispensação do medicamento seja adequada, bem como a orientação aos usuários, considerando que é uma nova apresentação disponível. O uso incorreto desta nova apresentação pode levar a eventos adversos muitas vezes graves como hepatotoxicidade, devendo a equipe de saúde e o paciente estar bem orientado sobre qual medicamento esta recebendo e como fazer uso deste.

A distribuição para todas as unidades de atendimento de Tuberculose será feita de maneira gradual, conforme as regiões sejam treinadas.

A bula do medicamento Rifampicina 300mg + Isoniazida 150mg (2x1 dose plena) está disponível no Bulário Eletrônico da Anvisa:

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=Farmanguinhos%20Isoniazida%2BRifampicina>

#### REFERÊNCIAS

Brasil. Ministério da Saúde. Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil. Ministério da Saúde, Brasília, 2019.

Brasil. Ministério da Saúde. Ofício Nº 104/2021/CGDR/DCCI/SVS/MS de 16 de abril de 2021. Informações sobre a disponibilidade do medicamento Rifampicina 300mg + Isoniazida 150mg (2x1 dose plena), comprimido, para tratamento da Tuberculose (TB). Brasília, 2021.



**MUDANÇA NA APRESENTAÇÃO E DOSAGENS  
DOS MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO  
DA TUBERCULOSE**



ESQUEMA BÁSICO DE TRATAMENTO DE TUBERCULOSE PULMONAR  
PARA ADULTOS E ADOLESCENTE ≥10 ANOS

| Esquema e duração                               | Faixas de peso | Dose   |
|---|----------------|--|
| 2 meses RHZE<br>(Fase de ataque<br>Fase 1)      | 20 kg a 35 kg  | 2 comprimidos                                    |
|   | 36 kg a 50 kg  | 3 comprimidos                                    |
|   | 51 kg a 70 kg  | 4 comprimidos                                    |
|   | > 70 kg        | 5 comprimidos                                    |
| 4 meses RH<br>(Fase de<br>manutenção Fase<br>2) | 20 kg a 35 kg  | 1 comp de 300/150 mg                             |
|   | 36 kg a 50 kg  | 1 comp de 300/150 mg<br>+<br>1 comp de 150/75 mg |
|   | 51 kg a 70 kg  | 2 comp de 300/150 mg                             |
|   | > 70 kg        | 2 comp de 300/150 mg +<br>1 comp de 150/75 mg    |



| Esquema e duração                                | Faixas de peso | Dose      |          |
|--|----------------|-----------|----------|
|  |                | 300/150mg | 150/75mg |
| 4 meses RH<br>(Fase de<br>manutenção-<br>Fase 2) | 20 kg a 35 kg  |           |          |
|  | 36 kg a 50 kg  |           |          |
|  | 51 kg a 70 kg  |           |          |
|  | > 70 kg        |           |          |

**COMPARAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES**

**4X1 RIPE**  
RIFAMPICINA/ISONIAZIDA/  
PIRAZINAMIDA/ETAMBUTOL  
150/75/400/275 MG

**DOSE PLENA 2X1**  
RIFAMPICINA/ISONIAZIDA  
300/150 MG

**MEIA DOSE 2x1**  
RIFAMPICINA/ISONIAZIDA  
150/75 MG

