

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS MENORES DE 6 ANOS DE IDADE

A vacinação infantil é essencial para proteger as crianças contra doenças infecciosas graves e fortalecer seu sistema imunológico desde cedo. Seguir o calendário vacinal é um ato de responsabilidade e amor, assegurando um futuro saudável e protegido para nossas crianças.



IDADE	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
Ao nascer	BCG	Única	Formas graves da tuberculose (miliar e meníngea)
	Hepatite B	Única	Hepatite B
2 meses	Pentavalente (DTP/Hib/HepB)	1ª dose	Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas pelo <i>Haemophilus influenzae B</i>
	VIP (Vacina Inativada Poliomielite)	1ª dose	Poliomielite
	Pneumocócica 10V	1ª dose	Infecções invasivas (como meningite e pneumonia) e otite média aguda, causadas pelos 10 sorotipos de <i>Streptococcus pneumoniae</i>
	VORH (Vacinal Oral Rotavírus Humano)	1ª dose	Diarreia por rotavírus
3 meses	Meningocócica C	1ª dose	Doença invasiva causada pela <i>Neisseria meningitidis</i> sorogrupo C
4 meses	Pentavalente (DTP/Hib/HepB)	2ª dose	Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas pelo <i>Haemophilus influenzae B</i>
	VIP (Vacina Inativada Poliomielite)	2ª dose	Poliomielite
	Pneumocócica 10V	2ª dose	Infecções invasivas (como meningite e pneumonia) e otite média aguda, causadas pelos 10 sorotipos de <i>Streptococcus pneumoniae</i>
	VORH (Vacinal Oral Rotavírus Humano)	2ª dose	Diarreia por rotavírus
5 meses	Meningocócica C	2ª dose	Doença invasiva causada pela <i>Neisseria meningitidis</i> sorogrupo C
6 meses	Pentavalente (DTP/Hib/HepB)	3ª dose	Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas pelo <i>Haemophilus influenzae B</i>
	VIP (Vacina Inativada Poliomielite)	3ª dose	Poliomielite
	Covid-19	1ª dose	Infecções pelo vírus Sars-Cov 2
7 meses	Covid-19	2ª dose	Infecções pelo vírus Sars-Cov 2
9 meses	Febre amarela	1ª dose	Febre amarela
	Covid-19	3ª dose	Infecções pelo vírus Sars-Cov 2
12 meses	Pneumocócica 10V	1º reforço	Infecções invasivas (como meningite e pneumonia) e otite média aguda, causadas pelos 10 sorotipos de <i>Streptococcus pneumoniae</i>
	Meningocócica C	1º reforço	Doença invasiva causada pela <i>Neisseria meningitidis</i> sorogrupo C
	SCR (Sarampo/Caxumba/Rubéola)	1ª dose	Sarampo, caxumba e rubéola
15 meses	VOP (Vacina Oral Poliomielite)	1º reforço	Poliomielite
	DTP (Difteria/Tétano/pertussis)	1º reforço	Difteria, tétano e coqueluche
	Hepatite A	Dose única	Hepatite A
	SCR e Varicela	2ª dose de SCR e 1ª dose de Varicela	Sarampo, caxumba, rubéola e varicela
4 anos	VOP (Poliomielite)	2º reforço	Poliomielite
	DTP (Difteria/Tétano/pertussis)	2º reforço	Difteria, tétano e coqueluche
	Varicela	2ª dose	Varicela
	Febre Amarela *	Reforço	Febre Amarela
Anualmente	Influenza**	Dose única**	Infecções pelo vírus influenza

*Caso a pessoa tenha recebido apenas uma dose da vacina antes de completar 5 anos de idade, deverá receber uma dose adicional, independentemente da idade em que o indivíduo procure o serviço de vacinação, respeitando o intervalo mínimo de 4 semanas entre as doses.

** Crianças de 6 meses até 2 anos, 11 meses e 29 dias de idade – Na primovacinação administrar duas doses com intervalo de 4 semanas.