

Vacinação contra Febre Amarela: Reações Adversas e Contraindicações



1) A vacina da febre amarela pode dar reação após a aplicação?

A maioria das reações que podem ocorrer são as locais e a mais frequente (4% em adultos) é a dor no local de aplicação, que tem intensidade leve e moderada, pode durar 1 ou 2 dias.

2) Quais são as outras reações que podem ocorrer?

As manifestações sistêmicas, que mais ocorrem e que são consideradas sem gravidade, são febre com duração de até 7 dias, cefaléia e mialgia.

3) Podem ocorrer reações graves?

Essa é uma vacina das mais seguras e eficazes, entretanto, raramente reações graves e até fatais tem sido notificadas. No Brasil, a incidência de eventos adversos graves associadas a vacina foi de 0,42 casos por 100.000 doses administradas.

4) Quais são os eventos adversos graves que podem ocorrer?

Reação alérgica grave: urticária generalizada, dispneia, broncoespasmo, edema de glote, anafilaxia;

Doença Neurológica Aguda: encefalite, meningite, Síndrome de Guillain-Barre. No Brasil ocorre 0,2 casos por 100.000 doses;

Doença Viscerotrópica Aguda: manifestações semelhantes à doença, muito rara, que ocorre por disseminação do vírus vacinal. A gravidade varia desde sintomas leves, até um quadro de falência de múltiplos órgãos e óbito. O risco desse evento grave ocorrer é de 0,05 casos por 100 mil doses aplicadas.

5) Quais os sintomas da doença viscerotópica aguda pós vacinal?

Após os sintomas iniciais inespecíficos: febre, cefaléia, mialgia, artralgia, náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, há o aparecimento de icterícia, trombocitopenia, elevação das transaminases, das bilirrubinas totais e da creatinina.

Podendo progredir para a insuficiência hepática, renal e até óbito.

6) Os indivíduos que apresentam contra-indicações para a vacinação podem apresentar reações graves e/ou mais frequentes?

Os estudos internacionais nos fazem crer que sim.

Vacinação contra Febre Amarela: Reações Adversas e Contraindicações

7) Quais os critérios de precaução e de contra-indicação por comorbidades para a vacina da FA?

Precauções:

- Crianças menores de 2 anos de idade não vacinadas contra febre amarela, não administrar as vacinas tríplice viral ou tetra viral simultaneamente com a vacina febre amarela.

O intervalo entre as vacinas é de 30 dias.

- Nos casos de doença agudas febris moderadas ou graves recomenda-se adiar a vacinação até a resolução do quadro com intuito de não se atribuir à vacina.

- Indivíduos que receberam a vacina da Febre Amarela tornam-se inaptos à doação de sangue por 04 semanas após a vacinação.

- Nutrizes e Lactantes: adiar a vacinação até a criança completar 6 meses de idade. Se a mãe for vacinada acidentalmente, suspender a amamentação por 10 dias.

- HIV: recomendado avaliação médica

- Lúpus Eritematoso Sistêmico: recomendado avaliação médica

- Artrite Reumatóide: recomendado avaliação médica

- Transplantados de medula óssea: recomendado avaliação médica

- Mieloma: recomendado avaliação médica

- Linfoma: recomendado avaliação médica

- Doença Falciforme em uso de Hidroxiureia: recomendado avaliação médica

- Indivíduos que encerraram as terapias imunossupressoras : recomendado avaliação médica

Contraindicações:

Está contraindicada a vacina contra Febre Amarela nas seguintes situações:

- Doença do Timo (Miastenia gravis, Timoma)

- Transplantados de órgãos sólidos

- Doença de Addison

- Indivíduos com história de reação anafilática relacionada a ovo de galinha e seus derivados

- Indivíduos com imunossupressão por doença ou em tratamento atual: radioterapia, quimioterapia, uso de imunomoduladores ou de corticóides em doses de 2mg/dia para crianças e 20mg/dia para adultos, por mais de 14 dias

- Indivíduos em uso dos medicamentos abaixo:

■ INFLIXIMABE

■ ETANERCEPTE

■ GOLIMUMABE

■ CERTOLIZUMABE

■ ABATACEPT

■ BELIMUMABE

■ USTEQUINUMABE

■ CANAQUINUMABE

■ TOLCILIZUMABE

■ RITOXIMABE

■ AZATIOPRINA

■ CICLOFOSFAMIDA

■ CICLOSPORINAS

■ SIROLIMUS

■ TACROLIMUS

■ FLUDARABINA

■ MEDICAMENTO ANTI-CÉLULA B.

Perguntas e respostas para Profissionais de Saúde

Vacinação contra Febre Amarela: Reações Adversas e Contraindicações

Orientações para a vacinação contra febre amarela para residentes ou viajantes para área com recomendação da vacina

Indicação	Esquema
Criança de 6 meses a 8 meses de idade	Não administrar
Crianças com 9 meses a 4 anos de idade	Administrar Dose Única
Pessoas a partir de 5 anos de idade, que nunca foram vacinadas ou sem comprovante de vacinação e sem comorbidades que possam contraindicar a vacinação	Administrar Dose Única
Gestante	Não administrar
Mulher que esteja amamentando crianças menores de 6 meses de vida	Caso seja administrada uma dose, suspender o aleitamento materno por 10 dias após a vacinação. procurar um serviço de saúde para orientação para manter a produção do leite materno e garantir o retorno à lactação.
Pessoas com 60 anos e mais, que nunca foram vacinadas ou sem comprovante de vacinação e sem comorbidades que possam contraindicar a vacinação	Administrar Dose Única
Viajantes Internacionais e para áreas de recomendação no Brasil, nunca vacinados ou sem comprovante de vacinação	Administrar Dose Única, pelo menos 10 dias antes da viagem

Mais informações:
www.prefeitura.sp.gov/covisa

**covisa**
COORDENADORIA DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SAÚDE