

INTERVALO ENTRE AS DOSES	VACINAS	ESQUEMA
PRIMEIRA VISITA	BCG ²	DOSE ÚNICA
	HEPATITE B	PRIMEIRA DOSE
	dT - DUPLA TIPO ADULTO ³	PRIMEIRA DOSE
	VIP	PRIMEIRA DOSE
	HPV ⁴	PRIMEIRA DOSE
	SARAMPO, CAXUMBA, RUBÉOLA - SCR	PRIMEIRA DOSE
2 MESES APÓS A PRIMEIRA VISITA	MENIGOCÓCICA ACWY ⁵	DOSE ÚNICA
	HEPATITE B ⁶	SEGUNDA DOSE
	dT - DUPLA TIPO ADULTO ³	SEGUNDA DOSE
	VIP	SEGUNDA DOSE
	SARAMPO, CAXUMBA, RUBÉOLA - SCR	SEGUNDA DOSE
4-6 MESES APÓS PRIMEIRA VISITA	HPV ⁷	SEGUNDA DOSE
	HEPATITE B ⁸	TERCEIRA DOSE
	dT - DUPLA TIPO ADULTO ³	TERCEIRA DOSE
	VIP	TERCEIRA DOSE
	FEBRE AMARELA	DOSE ÚNICA
A CADA 10 ANOS POR TODA A VIDA	dT - DUPLA TIPO ADULTO ⁹	REFORÇO

01. Adolescência - período entre 10 e 19 anos de idade. Caso a pessoa apresente documentação com esquema de vacinação incompleto, completar o esquema iniciado.
02. A vacina BCG é indicada para pessoas até 15 anos de idade.
03. Caso o adolescente tenha recebido três ou mais doses das vacinas DTP, DT e dT, aplicar uma dose de reforço, se decorridos 10 anos da última dose.
04. Vacina papilomavírus humano para meninas de 9 anos até 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade. E meninos de 9 anos a 14 anos, 11 meses e 29 dias.
05. Vacina Meningocócica ACWY de 11 anos a 14 anos, 11 meses e 29 dias.
06. O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose da vacina hepatite B é de 4 semanas.
07. O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose da vacina papilomavírus humano é de 6 meses.
08. O intervalo para a terceira dose da vacina hepatite B pode ser de dois meses após a segunda, desde que o intervalo de tempo decorrido da primeira dose seja, no mínimo, de quatro meses.
09. Na profilaxia do tétano após alguns tipos de ferimentos, deve-se reduzir este intervalo para 5 anos.

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde/CVE/Divisão de Imunização

BCG – Vacina BCG (contra tuberculose)

dT – Vacina adsorvida difteria e tétano adulto (dupla tipo adulto)

VIP – Vacina poliomielite 1,2 e 3 (inativada)

HPV – Vacina papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante)